

BSZ-203-MB08 Spenderzulassung nach Impfungen

Impfung	Impfstoffart	Rückstellung
BCG (Tuberkulose)	lebend	4 Wochen
Beriglobin	Human-Globulin	4 Monate
Cholera (inaktiviert) bei Wohlfühlen	tot	spendefähig
Cholera (Lebend-Impfstoff, z.B. Orochol)	lebend	4 Wochen
Diphtherie-Pertussis-Tetanus (DPT) 3-fach-Impfung	tot	spendefähig
Diphtherie-Impfung	tot	spendefähig
Diphtherie-Tetanus-Impfung	tot	spendefähig
Fleckfieber-Impfung	tot	spendefähig
FSME (Zeckenimpfung) aktiv	tot	spendefähig
Gelbfieber-Impfung	lebend	4 Wochen
Grippe-Impfung (Influenza)	tot	spendefähig
Hämophilus influenza (HIB)-Impfung	tot	spendefähig
Hepatitis A (aktiv Havrix, Vaqta)	tot	spendefähig
Hepatitis A + B Kombi (Twinrix)	gentechnologisch	1 Wochen
Hepatitis-B Impfung	gentechnologisch	1 Wochen
HPV-Impfung	gentechnologisch	spendefähig
Hyperimmunglobulin-Gabe (nach Schlangenbiss, Skorpion, Bakteriengifte)	tierische Globuline	12 Monate
Japanische Enzephalitis	tot	spendefähig
Masern-Impfung	lebend	4 Wochen
Meningokokken- (Meningitis-) Impfung	tot	spendefähig
Mumps-Impfung	lebend	4 Wochen
Pertussis- (Keuchhusten-) Impfung	tot	spendefähig
Pneumokokken-Impfung	tot	spendefähig
Poliomyelitis (inaktiviert) gg. Kinderlähmung (Spritze)	tot	spendefähig
Poliomyelitis (oral) Schluckimpfung gg. Kinderlähmung	lebend	4 Wochen
Röteln-Impfung	lebend	4 Wochen
Tetanus-Impfung (aktiv) (Wundstarrkrampf)	tot	spendefähig
Tetanus-Impfung (aktiv/passiv)	Human-Globulin	4 Monate
Tetanus-Diphtherie-Kombi-Impfung	tot	spendefähig
Tetanus-Diphtherie-Polio-Kombi-Impfung	tot	spendefähig
Tier-Seren	tierische Globuline	12 Monate
Tine-Test (Tuberkulose-Haut-Test)	tot	spendefähig
Tollwut-Impfung nach Biss oder Kontakt mit infiziertem Tier	lebend	12 Monate
Tollwut-Prophylaxe-Impfung	tot	spendefähig
Typhus (inaktiviert)-Impfung-Spritze (z.B. Typhim; Typherix)	tot	spendefähig
Typhus-Schluckimpfung	lebend	4 Wochen
Windpocken- (Varizellen-) Impfung ("Varilrix")	lebend	4 Wochen