

KLINIK FÜR THORAXCHIRURGIE

Vorschlag für ein Nachsorge-SCHEMA

bei Patienten mit **Lungenkarzinom Stadium I – III** (nach kurativer Therapie)

Jahre nach Primärtherapie	1					2				3		4		5		ab 6
Monate nach Primärtherapie	4-6 Wo	3	6	9	12	15	18	21	24	30	36	42	48	54	60	72(**)
Anamnese	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Körperliche Untersuchung	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Lungenfunktion (*) u. SO ²	●		●		●				●		●		●		●	●
Rö.-Thorax 2 Eb.	●	●		●		●			●			●		●		●
CT Thorax mit KM			●		●		●		●		●		●		●	
Bronchoskopie (***)		●			●				●				●			●
Oberbauch-Sonographie		●		●		●		●		●		●		●		●
Labor		●		●		●		●		●		●		●		●
Spezielle Untersuchungen	Je nach Beschwerdebild und / oder auffälligem Befund: CT Abdomen mit KM oder MRT, CCT bzw. MRT-Schädel, PET-CT, Skelettszintigramm, Röntgen Skelett															

Individuelle Änderungen sind möglich

(*) Diffusion / BGA bei vorbekannten Einschränkungen bzw. antiobstruktiver Therapie

(**) Weiter je nach Risiko einmal pro Jahr Röntgen-Thorax/CT Thorax im Wechsel

(***) Nur bei zentralen Tumoren, Manschettenresektionen, hohem Risiko (> 40py), schweren Dysplasien bei vorherigen Bronchoskopien

Labor: Blutbild, Natrium, Kalium, Calcium, Kreatinin, LDH, GOT, GPT, AP; an CT-Terminen Kreatinin und TSH