2. line

KT-US-740-0603/PALISADES-2:

Phase: III
Entität: DLBCL
IMP: Glofitamab und Pirtobrutinib vs. SOC
PI: **PD Dr. Reinhard Marks**
Studienassistenz: **med1.kontakt.studienzentrale@list.uniklinik-freiburg.de**

Wichtige In / Exclusion:
Rekrutierung in Kürze möglich: INC: Chemotherapierefraktärität oder Relapse nach < 12 Monate nach Therapieende, Vortherapie: inkl. Anti-CD20-Antikörper, Anthrazyklin-haltige Chemotherapie, ECOG 0-2; EXC: CAR-T-Zelltherapie, Malignom in der Vorgeschichte (<3 Jahre), Transformierte Lymphome, Burkitt Lymphom, PCNSL/SCNSL u.a., ausgewählte Vorerkrankungen ZNS-System

Plato

Phase: II
Entität: **Mantelzell-Lymphom**
IMP: Glofitamab und Pirtobrutinib vs. SOC
PI: **Dr. Cornelius Miething**
Studienassistenz: **Annika Linder Tel: 32932** und **Ina Schwörer Tel: 32908**

Wichtige In / Exclusion:
INC: mindestens einer Vortherapie (inkl. Anti-CD20-Antikörper plus Anthrazyklin und/oder Bendamustin und/oder Fludarabin); ECOG ≤ 2. EXC: ZNS-Beteiligung, Blutungsereignisse in der Vorgeschichte, Vorbehandlung mit CD20-BiTE, BTKi oder CAR-T, Antikoagulation mit Vitamin-K-Antagonisten.

GSK5926371-001 / 300557

Phase: I/II
Entität: **DLBCL, Marginalzonen Lymphom (MZL), Foll. Lymphom (FL), Mantelzell-Lymphom (MCL)**
IMP: GSK5926371 (T-cell Engager, trispez. AK CD19, CD20, CD3) bei rezidiviert-refraktärem B-NHL
PI: **PD Dr. Reinhard Marks**
Studienassistenz: **med1.kontakt.studienzentrale@list.uniklinik-freiburg.de**

Wichtige In / Exclusion:
Rekrutierung in Kürze möglich: INC: mind. 2 Vortherapien, inkl.anti-CD-20-AK, ECOG 0-2; EXC: anderes Malignom mit Therapiebedarf innerhalb 24 Monate; Allo-Tx innerhalb von 12 Monaten; Auto-Tx/CAR-T-Zelltherapie innerhalb von 3 Monaten; anti-CD19 oder CD20-BiTE innerhalb von 8 Wochen

QuickQueck Studiensuche

www.quickqueck.de - Suche für onkologische Studien

UNIVERSITÄTSKLINIKUM FREIBURG
Klinik für Innere Medizin I, Interdisziplinäres Tumorzentrum (ITZ)
Schwerpunkt Hämatologie, Onkologie und Stammzelltransplantation
Sektion Klinische Studienzentrale und Early Clinical Trial Unit (ECTU)
Kooperative Studiengruppe ZNS-Lymphome
Hugstetter Str. 55, D-79106 Freiburg
✉ **Kontakt:** med1.kontakt.studienzentrale@list.uniklinik-freiburg.de

Stand bei Drucklegung
Herausgeber: Universitätsklinikum Freiburg © 10/2026
Redaktion: Klinik für Innere Medizin I - Universitätsklinikum Freiburg
Gestaltung: Klinik für Innere Medizin I - Universitätsklinikum Freiburg
Bildnachweis: © Universitätsklinikum Freiburg | © AdobeStock

UNIVERSITÄTS KLINIKUM FREIBURG
KLINIK FÜR INNERE MEDIZIN I
Hämatologie, Onkologie und Stammzelltransplantation

REKRUTIERENDE STUDIEN LYMPHOME



1. line

CAROLYN / CA082-1215

Phase: II
Entität: Primäres ZNS-NHL
IMP: CAR-T-Zell-Therapie (Lisocabtagene Maraleucel)
PI: PD Dr. Elisabeth Schorb
Studienassistenz: Natalie Malenica Tel: 72140
Wichtige In / Exclusion:
INC: fehlende Eignung zur Durchführung einer Stammzelltransplantation, PR/CR nach Standardinduktionstherapie, ECOG 0-2; EXC: sekundäres ZNS-Lymphom, aktives Malignom (mind. 2 Jahre CR für zurückliegende Malignome), klinisch signifikante, begleitende Pathologie des ZNS

DETECT_CNSL

Entität: Primäres ZNS-NHL
PI: PD Dr. Florian Scherer
Studienassistenz: Max Deuter Tel: 35730
Wichtige In / Exclusion:
Indikation zur neurochirurgischen stereotaktischen Biopsie bei V.a. ZNS-Lymphom; kein Zustand oder Anomalie, der/die die Sicherheit einer Liquorpunktion gefährden

MOIRAI / CLL18

Phase: III
Entität: CLL
IMP: Zeitlich begrenzte Therapie mit Ven/Obi oder Ven/Pirtobrutinib vs. MRD gesteuerte Therapie mit Ven/Pirtobrutinib
PI: Prof. Dr. Jesus Duque
Studienassistenz: Dagmar Wladarz Tel: 32912
Wichtige In / Exclusion:
INC: Behandlungsbedürftige, bisher unbehandelte CLL/SLL, ECOG 0-2;
EXC: Schwere kardiovaskuläre Erkrankungen, GFR <30ml/min, aktive Infektionen

PRIMA-CNS

Phase: III
Entität: Primäres ZNS-NHL
IMP: 1 Zyklus R-MTX als Vorphase, danach 3 Zyklen R-MP+ Procarbazin-Erhaltung vs. 2 Zyklen R-MTX-AraC, Hochdosis-CTx mit Stammzell-transpantation
PI: PD Dr. Elisabeth Schorb
Studienassistenz: Natalie Malenica Tel: 72140
Wichtige In / Exclusion:
65-70 Jahre und nicht für intensivere Therapie geeignet oder ≥70 Jahre, ED primäres ZNS-DLBCL, ECOG ≤ 2 (wenn Lymphom-bedingt auch > 2 möglich), Krea-Clearance ≥ 50 ml/min, prinzipiell hochdosisfähig

1. line

Plato

Phase: II
Entität: Mantelzell-Lymphom
IMP: Glofitamab und Pirtobrutinib vs. SOC
PI: Dr. Cornelius Miething
Studienassistenz: Annika Linder Tel: 32932
Wichtige In / Exclusion:
INC: ≥ 65 Jahre oder ≥ 60 Jahre und nicht geeignet für intensive Chemotherapie, ECOG ≤ 2. EXC: ZNS-Beteiligung, Blutungsereignisse in der Vorgeschichte, Vorbehandlung mit CD20-BiTE, BTKi oder CAR-T, Antikoagulation mit Vitamin-K-Antagonisten.

CLL16

Phase: III
Entität: CLL
IMP: Acalabrutinib (2nd line BTKi), Obinutuzumab + Venetoclax vs. Obinutuzumab + Venetoclax
PI: Prof. Dr. Jesus Duque
Studienassistenz: Dagmar Wladarz Tel: 32912
Wichtige In / Exclusion:
CLL mit Therapieindikation laut iwCLL. Hochrisiko CLL d.h. 17p-Deletion, TP53-Mutation oder komplexer Karyotyp. FISH Analyse (oder Karyotyp) und TP53 mut (hier lange Wartezeit) vor Einleitung einer Therapie bei CLL

CARMAN

Phase: II
Entität: Mantelzell-Lymphom
IMP: CAR-T-Zelltherapie bei Hochrisiko-Mantelzelllymphom
PI: PD Dr. Reinhard Marks
Studienassistenz: Ina Schwörer Tel: 32908
Wichtige In / Exclusion:
Hochrisiko-MCL, Stadium II-IV (Ann Arbor), TP53 Mutation u/o Überexpression u/o MIPI-c noch intermediär oder hohes Risiko, ECOG 0-2, keine ZNS-Vorerkrankung

2. line

AETHER/HO165

Phase: I/II
Entität: CLL / SLL
IMP: Venetoclax in Kombination mit Epcoritamab
PI: Prof. Dr. Jesus Duque
Studienassistenz: Ina Schwörer Tel: 32908
Wichtige In / Exclusion:
INC: Behandlungsnotwendigkeit nach IWCLL-Kriterien, ECOG 0-2;
EXC: vorherige Therapie mit CD3xCD20 BiTE oder CAR-T-Zell-Therapie, vorherige Therapie mit Venetoclax innerhalb 24 Monate oder Progression hierunter, Richter Transformation, anderes, behandlungsbedürftiges Malignom, PNP > Grad 2

CLEAR

Phase: II
Entität: DLBCL
IMP: Loncastuximab Tesirine und Epcoritamab
PI: PD Dr. Reinhard Marks
Studienassistenz: Ina Schwörer Tel: 32908
Wichtige In / Exclusion:
INC: ECOG 0-2; notwendige Vortherapie: mind. 1 Zyklus Anti-CD-20-mAB/ Anthrazyklin-Kombinationstherapie (Erstlinie); vorherige CAR-T-Zell-Therapie gestattet (Zweitlinie); EXC: Immunsuppression (≤ 10 mg Prednisonäqivalent gestattet); Toxizität aus Vortherapien > Grad 1; ZNS-Beteiligung

BGB-16673-302 (CaDAnCe-302)

Phase: III
Entität: CLL / SLL
IMP: BGB-16673 vs. SOC
PI: Prof. Dr. Jesus Duque
Studienassistenz: Juli von Guilleaume Tel: 32925
Wichtige In / Exclusion:
Wichtige In/Exclusion: INC: vorheriger Therapie mit BTK- und BCL2-Inhibitor, ECOG 0-2; EXC: B-PLL, T-PLL, vermutete Richter-Transformation, autologe Stammzelltransplantation oder CAR-T-Zellen in den letzten 3 Monaten, zerebraler Befall, Vortherapie mit BTK-Degrader