
Anamnese
Familienanamnese
Sonografie
Begleitende Diagnostik
Hstff, Krea, Hsre, E-lyte, BB
Albumin i.S., HbA1c, Glu,
U-Stix, UAE,
Diagnostische Kriterien nicht erfüllt
DD erwägen
Siehe Tab. 2
genetische Diagnostik, wenn Konsequenz für Patient ersichtlich
klinische Diagnose :
Nierenzysten (s. Tab. 1)
+ 1 der folgenden:
- pos. Familienanamnese
- Leberzysten
- Pankreaszysten
- Genetik mit Nachweis einer pathogenen Mutation
Risiko Screening für intrakranielle Aneurysmen
Aufklärung.
MR-Angio ZNS
wenn pos. Risiko
oder Patientenwunsch
Abschätzung der Progressions-wahrscheinlichkeit anhand von:
o Alter/GFR/Nierengröße
o Geschlecht
o FA für ESRD
o Proteinurie
o Makrohämaturie
o > 3 Schwangerschaften
o Hyperfiltratation
Screening für Studien
Basistherapie:
Blutdruck < 120/80 mmHg (s.u.)
Nikotinkarenz
Trinkmenge 2-3 L/Tag
intensivierte Therapie:
Blutdruck < 110/75 mmHg
Screening bzgl. Tolvaptan
(siehe separater Standard)