



Arm-Halte Versuch

Beide Arme 10 Sek. nach vorn ausstecken lassen. Absinken oder kein Anheben eines



Blickwendung / Schulter-Tapping

Stellen Sie sich auf die Seite der Parese neben den Pat. Beobachten Sie die spontane Kopf- und Augenstellung.

Schaut der Pat. (fast) ausschließlich zur nicht gelähmten Seite?
Tippen Sie nun spürbar auf die Schulter des paretischen Armes
und fordern Sie zu längerer Zuwendung/Blickkontakt mit Ihnen auf.
Blickt der Pat. trotzdem bevorzugt in die Richtung der gesunden Seite?

Schritt 1 Getrennte Testung



Testung Sensible Extinktion

Schritt 1: Prüfen Sie die Berührungsempfindung bei geschlossenen Augen durch "Bestreichen" der Hände einzeln nacheinander mit jeweils direkter Abfrage nach der Berührung ("Spüren Sie das?").

Auch ein einseitiges vermindertes Berührungsempfingen wird als wahrgenommen gewertet.

NUR wenn Berührung auf beiden Seiten wahrgenommen wird:

Schritt 2



Schritt2: Gleichzeitige Prüfung der Berührungsempfindung bei geschlossenen Augen durch gleichzeitiges "Besteichen" der Hände ("Auf welcher Seite spüren Sie die Berührung?").

Die Prüfung der Extinktion setzt voraus, dass an beiden Händen bei Einzelprüfung eine Berührung wahrgenommen werden kann (siehe Schritt 1).

Im Krankheitsfall wird bei gleichzeitiger Berührung beider Hände der Berührungsreiz auf der Seite der Schwäche nicht mehr wahrgenommen (Auslöschungspränomen).

Aphasie-Testung





Laut von 1-10 zählen lassen. Ab 1 Fehler als falsch zu werten. Mögliche Fehler sind:

Auslassung von Zahlen Falsche Worte für die Zahlen (z.B. "kier" statt "vier") Verdoppelungen

Pause von mehr als 5 Sekunden zwischen 2 Zahlen Dauer gesamt > 15s



Renennen lassen

Federbild in der App zeigen und benennen lassen Richtig ist neben dem Wort "Feder" nur "Daune" oder "Flaum" zu werten.

Alternativen: Untersucher soll Kugelschreiber oder anderen Gegenstand benennen lassen; alternativ auf eigene Nase zeigen und diese vom Pat. benennen lassen



Folgenden Satz nachsprechen lassen.

"Das Kind überreicht der Mutter ein Geschenk" Wenn fehlerhaft 1x wiederholen. Mögliche Fehler: Wortauslassung /unvollständige Wiederholung Wörter verdreht oder nicht korrekt (z.B. "gibt" statt "überreicht", "Kinn" statt "Kind")



Zur Decke/Himmel zeigen lassen.



Ohrläppchentest

Mit der nicht-paretischen Hand in das gegenüberliegende Ohrläppchen zwicken lassen. Wenn fehlerhaft, Aufgabe 1x wiederholen.

Richtig ist nur, wenn die entsprechende Hand ins gegenüberliegenden Ohr zwickt oder am Ende in unmittelbarer Nähe ist.



Details zu den einzelnen Untersuchungsschritten finden Sie in der LESTOR-App