

**Praxisempfehlungen für
psychologische Interventionen in der Rehabilitation**

Koronare Herzerkrankung

Zweite, erweiterte Ausgabe



Abteilung Qualitätsmanagement und Sozialmedizin
(Direktor: Prof. Dr. Wilfried H. Jäckel)

Erarbeitet von:

Dipl.-Psych. Christina Reese, Prof. Dr. Oskar Mittag
Universitätsklinikum Freiburg, Abteilung Qualitätsmanagement und Sozialmedizin

Beteiligte Expertinnen und Experten:

Prof. Dr. Dr. Jürgen Bengel
Albert-Ludwigs-Universität Freiburg,
Institut für Psychologie,
Abteilung für Rehabilitationspsychologie und
Psychotherapie

Dr. Annegret Boll-Klatt
Universität Hamburg,
Institut für Psychotherapie

Dr. Carsten Cordes
Gollwitzer-Meier-Klinik, Bad Oeynhausen

Dr. Ruth Deck
Universitätsklinikum Schleswig-Holstein,
Institut für Sozialmedizin

Dipl.-Psych. Rudolf Dräger-Recktenwald
Patientenvertreter, Titisee-Neustadt

Prof. Dr. Dr. Hermann Faller
Universität Würzburg,
Institut für Psychotherapie und Medizinische
Psychologie

Dipl.-Psych. Lena Fleig
Freie Universität Berlin,
Arbeitsbereich Gesundheitspsychologie

Prof. Dr. Siegfried Gauggel
Universitätsklinikum der RWTH Aachen,
Institut für Medizinische Psychologie und
Medizinische Soziologie

Dr. Werner Geigges
Rehaklinik Glotterbad, Glottertal

Prof. Dr. Gesine Grande
Hochschule für Technik, Wirtschaft und Kul-
tur Leipzig, Fachbereich Sozialwesen

Prof. Dr. Martin Hautzinger
Eberhard Karls Universität Tübingen,
Psychologisches Institut,
Arbeitsbereich Klinische Psychologie und
Psychotherapie

Prof. Dr. Christoph Herrmann-Lingen
Universitätsmedizin Göttingen,
Abteilung Psychosomatische Medizin und
Psychotherapie

Prof. Dr. Wolfgang Langosch
Staufen

Dipl.-Psych. Britta Mai
Reha-Zentrum Klinik Wetterau,
Bad Nauheim

Prof. Dr. Wilhelm Niebling
Universitätsklinikum Freiburg,
Lehrbereich Allgemeinmedizin

Dipl.-Psych. Sarah Pomp
Freie Universität Berlin,
Arbeitsbereich Gesundheitspsychologie

Dipl.-Psych. Dieter Schmucker
Städtische Rehakliniken – Rehazentrum
Bad Waldsee

Dipl.-Psych. Sascha Wörner
Theresienklinik Bad Krozingen

Dr. Ulrike Worringer
Deutsche Rentenversicherung Bund,
Abteilung Rehabilitation

Die Praxisempfehlungen wurden im Rahmen des Projekts „Psychologische Interventionen in der Rehabilitation von PatientInnen mit chronischen Rückenschmerzen oder koronarer Herzerkrankung: Systematische Entwicklung von Praxisempfehlungen“ erstellt, Projektlaufzeit: Oktober 2009 bis Mai 2012.

Förderung: Deutsche Rentenversicherung Bund; FKZ 0423-40-64-50-18

Die Verantwortung für den Inhalt der Praxisempfehlungen liegt bei den Autoren.

Bitte wie folgt zitieren:

Reese, C., Mittag, O., Bengel, J., Boll-Klatt, A., Cordes, C., Deck, R., Dräger-Recktenwald, R., Faller, H., Fleig, L., Gauggel, S., Geigges, W., Grande, G., Hautzinger, M., Herrmann-Lingen, C., Langosch, W., Mai, B., Niebling, W., Pomp, S., Schmucker, D., Wörner, S. & Worringer, U. (2018). Praxisempfehlungen für psychologische Interventionen in der Rehabilitation: Koronare Herzerkrankung. 2., erweiterte Ausgabe. Zugriff am tt.mm.jjjj. Verfügbar unter <https://www.uniklinik-freiburg.de/severa/praxisempfehlungen.html>

Verknüpfung der Praxisempfehlungen mit der KTL für die zweite, erweiterte Ausgabe

In einem Zusatzprojekt erfolgte eine Verknüpfung der Praxisempfehlungen mit der Klassifikation therapeutischer Leistungen in der medizinischen Rehabilitation (KTL), Ausgabe 2015 (Deutsche Rentenversicherung, 2014), Projektlaufzeit: November 2017 bis April 2018.

Das Zusatzprojekt wurde durch die Sektion Versorgungsforschung und Rehabilitationsforschung des Universitätsklinikums Freiburg (Dr. Christina Reese) durchgeführt. Als Expertinnen beteiligt waren Dipl.-Psych. Britta Mai, Reha-Zentrum Klinik Wetterau, Bad Nauheim, Dr. Ulrike Worringer und Dipl.-Psych. Antje Hoppe, Deutsche Rentenversicherung Bund, Abteilung Rehabilitation, sowie Anke Mitschele, Deutsche Rentenversicherung Bund, Bereich Reha-Qualitätssicherung, Epidemiologie und Statistik.

Förderung: Deutsche Rentenversicherung Bund; FKZ 0423-40-64-50-01

Inhalt

Allgemeine Vorbemerkungen	5
Danksagung	9
Interessenskonflikte	9
Teil A: Psychische Funktionen	
Depression und Angst	10
Anpassungsstörung, Akute Belastungsreaktion, Posttraumatische Belastungsstörung	14
Affektdurchlässigkeit/ -labilität	16
Kognitive oder Verhaltensstörung aufgrund einer Schädigung oder Funktionsstörung des Gehirns	16
Weitere psychische Komorbidität	17
Akute psychische oder psychosoziale Probleme, Probleme bei der Krankheits- und Krankheitsfolgenbewältigung	17
Teil B: Körperfunktionen	
Implantierter Kardioverterfibrillator (ICD)	18
Hypertonie	19
Herzrhythmusstörungen	19
Sexualleben	20
Teil C: Umweltfaktoren und personenbezogene Faktoren	
Lang andauernde psychosoziale Belastungen	21
Problemlagen in Bezug auf Erwerbstätigkeit	23
Rauchen	25
Bewegungsmangel	27
Fehlernährung	29
Ungenügende Adhärenz	30
Auf einen Blick: Empfohlene Screening-Fragen für Rehabilitanden mit KHK	31
Eine Auswahl aktueller Informationen und Broschüren der DRV	33
Literatur	35

Allgemeine Vorbemerkungen

Hintergrund und Ziele

Vorliegende Reha-Leitlinien der Fachgesellschaften oder die Reha-Therapiestandards der Deutschen Rentenversicherung Bund schließen psychologische Interventionen explizit ein, sie sind aber nicht differenziert genug, um praktisches psychologisches Handeln im Einzelfall leiten zu können. Ziel des Projektes „Psychologische Interventionen in der Rehabilitation von PatientInnen mit chronischen Rückenschmerzen oder koronarer Herzerkrankung: Systematische Entwicklung von Praxisempfehlungen“ (Förderung: Deutsche Rentenversicherung Bund) war die Formulierung von möglichst konkreten, auf einzelne Problemlagen bezogenen Empfehlungen für psychologisches Handeln. Die Praxisempfehlungen sollen Psychologen¹, Ärzte und andere Mitarbeiter des interdisziplinären Reha-Teams dabei unterstützen, psychologisch relevante Problemlagen von Rehabilitanden zuverlässig festzustellen und geeignete psychologische Interventionen zu wählen.

Bei der Formulierung der Praxisempfehlungen haben wir uns von folgenden Voraussetzungen leiten lassen: Die Empfehlungen sollten einen möglichst hohen Konkretisierungsgrad aufweisen, sie sollten auf der bestmöglichen Evidenz beruhen, und sie sollten strukturkonservativ umgesetzt werden können. Der Begriff „psychologische Intervention“ wird in den Praxisempfehlungen im übergreifenden Sinn für diagnostische, therapeutische oder edukative Interventionen gebraucht, die psychologisch fundiert sind oder die sich auf psychische Funktionen beziehen. Psychologische Interventionen werden in der Regel von Psychologen durchgeführt. Bestimmte psychologische Interventionen (z. B. Motivierende Gesprächsführung, Handlungs- und Bewältigungsplanung) können aber auch von Mitarbeitern anderer Professionen eingesetzt werden.

Wie wurden die Praxisempfehlungen entwickelt?

Die vorliegenden Empfehlungen für psychologische Interventionen in der Rehabilitation von Patienten mit koronarer Herzerkrankung (KHK) wurden in mehreren Schritten entwickelt. Zuerst führten wir eine umfassende, systematische Recherche nach relevanten Übersichtsarbeiten und Leitlinien durch (Reese, Spieser & Mittag, 2012). Gleichzeitig befragten wir die psychologischen Abteilungen in der stationären und ambulanten kardiologischen Rehabilitation zu Strukturen und Praxis (Mittag et al., 2012; Reese, Jäckel & Mittag, 2012). Auf Basis dieser Ergebnisse wurde im Rahmen eines anschließenden Expertenworkshops eine Konsultationsfassung der Praxisempfehlungen formuliert. Diese Konsultationsfassung schickten wir mit der Bitte um Kommentierung an die leitenden Psychologen und Chefärzte aller stationären und ambulanten kardiologischen Einrichtungen. Außerdem diskutierten wir im Rahmen einer Fokusgruppe mit Rehabilitanden über zentrale Aspekte der Praxisempfehlungen. Die Anmerkungen und Kommentare wurden von uns ausgewertet und im Rahmen eines abschließenden Expertenworkshops berücksichtigt, in dem die Endversion der Praxisempfehlungen konsentiert wurde (Mittag & Reese, 2013).

Strukturvoraussetzungen der Praxisempfehlungen

Damit die Empfehlungen innerhalb der gegebenen Strukturen umsetzbar sind, berücksichtigten wir bei der Erstellung der Praxisempfehlungen das vorhandene durchschnittliche Stellenverhältnis der Psychologen in den Einrichtungen. In unserer ausführlichen Erhebung zu den Strukturen und zur Praxis in den Einrichtungen ermittelten wir die folgenden Stellenverhältnisse der Psychologen: In der **stationären** kardiologischen Rehabilitation sind durchschnittlich 1,15 Psychologen für 100 kardiologische Rehabilitanden zuständig (Standardabweichung: 0,48); in der **ambulanten** kardiologi-

¹ Aus Gründen der besseren Lesbarkeit wird im vorliegenden Dokument das generische Maskulinum verwendet. Es sind selbstverständlich immer beide Geschlechter gemeint.

schen Rehabilitation sind durchschnittlich 2,04 Psychologen für 100 kardiologische Rehabilitanden zuständig (Standardabweichung: 1,46). Das durchschnittliche Stellenverhältnis in den stationären kardiologischen Einrichtungen liegt somit knapp unterhalb der personellen Anforderungen, die die Deutsche Rentenversicherung Bund für die stationären medizinischen Reha-Einrichtungen formuliert hat (für die Kardiologie: 1,25 Psychologen pro 100 Rehabilitanden) (Deutsche Rentenversicherung Bund, 2010).

Die Praxisempfehlungen beziehen auch Ärzte sowie weitere Mitarbeiter im interdisziplinären Team ein. Daher ist eine entsprechende Qualifikation / Schulung der interdisziplinären Mitarbeiter für die Anwendung der Praxisempfehlungen dringend wünschenswert. Die Mitarbeiter sollen regelmäßig an Fortbildungen zu wichtigen Themen teilnehmen (z. B. Erkennen psychischer Störungen, Motivierende Gesprächsführung). Es gehört zu den Aufgabengebieten der Psychologen, bei der Fortbildung der Mitarbeiter mitzuwirken.

Für die Diagnosestellung einer psychischen Störung (F-Diagnose) sowie für psychotherapeutische Einzelgespräche gilt ein Approbationsvorbehalt; diese Tätigkeiten dürfen nur von entsprechend qualifizierten Personen durchgeführt werden. Psychodiagnostische Verfahren im Vorfeld der Diagnosestellung (z.B. Beck Depressions-Inventar, Allgemeine Depressions-Skala) können auch von nicht approbierten Psychologen übernommen werden (vgl. Deutsche Rentenversicherung, 2011). In jeder Einrichtung soll mindestens ein approbierter Psychotherapeut arbeiten; die Chef- und Oberärzte sollen die Weiterbildung „Psychosomatische Grundversorgung“ oder „Psychokardiologische Grundversorgung“ absolviert haben. Die nicht approbierten Psychologen sollen regelmäßig vom approbierten Psychotherapeuten supervidiert werden.

Eine weitere wichtige Voraussetzung für die Anwendung der Praxisempfehlungen ist es, dass die interdisziplinären Mitarbeiter ein Team bilden und regelmäßige, interdisziplinäre Besprechungen durchführen. Die Förderung der Kommunikation im Behandlungsteam kann ein Ziel von Mitarbeiterfortbildungen sein, bei denen Psychologen mitwirken.

Bei allen Interventionen ist darauf zu achten, dass eine Sprache verwendet wird, die gut verständlich ist für die Rehabilitanden. Das Vorwissen der Rehabilitanden ist dabei zu berücksichtigen. Die Inhalte müssen anschaulich und möglichst konkret sein, alltägliche Erfahrungen der Rehabilitanden aufgreifen sowie den kulturellen Hintergrund der Rehabilitanden berücksichtigen.

Anwendung der Praxisempfehlungen

Die praktische Anwendung von Empfehlungen muss immer unter Berücksichtigung der klinischen Expertise des Behandlers und der individuellen Situation des einzelnen Rehabilitanden erfolgen. David Sackett, einer der Pioniere der evidenzbasierten Medizin (EBM), formulierte diese Grundvoraussetzung in Bezug auf die Anwendung der EBM wie folgt:

“Evidence-based medicine (EBM) is the integration of best research evidence with clinical expertise and patient values. [...] By patient values we mean the unique preferences, concerns and expectations each patient brings to a clinical encounter and which must be integrated into clinical decisions if they are to serve the patient.“ (Sackett et al., 2000, p. 1).

Praxisempfehlungen und Leitlinien sollen den damit verbundenen Prozess des vernünftigen Abwägens unterstützen. Die vorliegenden Empfehlungen wurden systematisch anhand der besten vorliegenden Evidenz formuliert und in einem aufwendigen Prozess von Wissenschaftlern und Klinikern konsentiert. Sie bilden eine praxisorientierte Entscheidungshilfe für psychologische Interventionen bei bestimmten Problemlagen.

Gender

Trotz einzelner empirischer Hinweise reicht die vorliegende Evidenz nicht aus, um geschlechtsspezifische Empfehlungen für psychologische Interventionen abzuleiten (vgl. Mittag & Grande, 2008). Unterschiede in der psychosozialen Lebenslage, Sozialisation und in den Rollenstereotypen von Frauen und Männern beeinflussen jedoch rehabilitationsbezogene Erwartungen und Ziele, Emotionsregulation, Krankheitsbewältigungsstrategien, Inanspruchnahmeverhalten bzw. -barrieren gegenüber spezifischen Angeboten (z. B. körperliches Training) und die Möglichkeiten nachhaltiger Lebensstilmodifikation unter Alltagsbedingungen. In Gruppenangeboten sollten deshalb nach Möglichkeit mindestens zwei Teilnehmer eines Geschlechts zur Gruppe gehören. Insbesondere geschlechtsspezifische psychosoziale Aspekte der Krankheit, des Krankheitsverhaltens und der Krankheitsfolgen sollten in psychologischen Interventionen thematisiert werden.

Zentrale Funktion der Ärzte

Bestimmte Empfehlungen, in denen es um die Indikationsstellung für psychologische Interventionen geht (z. B. Depressions- und Angstscreening, Empfehlungen 1-3), adressieren explizit die Gruppe der Ärzte. Diese Empfehlungen wurden auf Grundlage der Ergebnisse der o. g. ausführlichen Erhebung zu den Strukturen und zur Praxis in den Einrichtungen formuliert. In dieser Befragung zeigte sich, dass die Ärzte in den meisten Einrichtungen eine zentrale Steuerungsfunktion haben und die Zuweisung der Rehabilitanden zu bestimmten Interventionen durch den (aufnehmenden) Arzt geschieht. Selbstverständlich wäre es optimal, wenn die Feststellung bestimmter psychologisch relevanter Problemlagen und die Anberaumung entsprechender Maßnahmen durch den Psychologen erfolgen könnten. Dies würde allerdings voraussetzen, dass der Psychologe mit allen Rehabilitanden ein Aufnahmegespräch führt, was in den meisten Einrichtungen aufgrund der Personalsituation nicht zu leisten ist.

Routinemäßiges psychologisches Screening

In der orthopädischen und kardiologischen Rehabilitation bleibt psychische Komorbidität oft unerkannt (Härter et al., 2004). Daher wird in den Praxisempfehlungen zu einem routinemäßigen, standardisierten psychologischen Screening aller Rehabilitanden geraten, um die Entdeckungsrate psychischer Komorbidität (insbesondere Depression und Angst) zu verbessern und eine bedarfsgerechte Zuweisung zu psychologischen bzw. psychotherapeutischen Interventionen zu ermöglichen. Außerdem wird ein routinemäßiges, standardisiertes Screening empfohlen, das sich auf lang andauernde psychosoziale Belastungen, soziale Isolation sowie Probleme in Bezug auf Erwerbstätigkeit bezieht.

Psychologisch fundierte Interventionen durch das Reha-Team

In den Praxisempfehlungen wird die Anwendung verschiedener psychologisch fundierter Interventionen durch das Reha-Team empfohlen. Zwei wichtige Interventionen sollen an dieser Stelle kurz erläutert werden: Die „Motivierende Gesprächsführung“ und die „Handlungs- und Bewältigungsplanung“.

Motivierende Gesprächsführung. Motivierende Gesprächsführung ist eine von Miller und Rollnick (2009) entwickelte klientenzentrierte, zielgerichtete Beratungsmethode zur Förderung der Motivation für Verhaltensänderungen. Bei dieser Methode wird davon ausgegangen, dass jede Person über ein großes Veränderungspotenzial, Motivation und Ressourcen verfügt. Aufgabe des Therapeuten ist es, natürliche Veränderungsprozesse zu unterstützen, indem Ambivalenzen erfasst und aufgelöst werden. Motivierende Gesprächsführung basiert auf den folgenden vier Grundprinzipien: (a) Empathie ausdrücken; (b) Diskrepanzen entwickeln; (c) Widerstand umlenken; (d)

Selbstwirksamkeit fördern. Ursprünglich wurde die Motivierende Gesprächsführung vor allem im Suchtbereich genutzt; inzwischen liegen auch Studienergebnisse für die Wirksamkeit in verschiedenen anderen Anwendungsbereichen vor (z. B. Nikotinabusus oder Übergewicht) (vgl. Dunn et al., 2001; Rubak et al., 2005).

Handlungs- und Bewältigungsplanung. Gute Vorsätze in Bezug auf Gesundheitsverhalten (z. B. körperliche Aktivität oder gesunde Ernährung) werden häufig nicht in die Tat umgesetzt („Intentions-Verhaltens-Lücke“). Die Umsetzung von Intentionen in (Gesundheits-)Verhalten kann durch den Einsatz von Selbstregulationsstrategien wie der Handlungs- und Bewältigungsplanung gefördert werden. Im Rahmen der **Handlungsplanung** formuliert der Patient konkrete Pläne, wann, wo und wie er bestimmtes Verhalten umsetzen möchte. Bei der **Bewältigungsplanung** werden Barrieren antizipiert und konkrete Bewältigungsstrategien entwickelt. Auf diese Weise können Intentionen auch dann umgesetzt werden, wenn Hindernisse auftauchen. Studienergebnisse belegen, dass Gesundheitsverhalten in verschiedenen Bereichen (z. B. körperliche Aktivität, gesunde Ernährung) durch den Einsatz von Handlungs- und Bewältigungsplanung gefördert werden konnte (Snihotta et al., 2005; Verplanken et al., 1999).

Bedeutung der Nachsorge

Im Rahmen einer drei- bis vierwöchigen Rehabilitation können komorbide psychische Störungen (z. B. Depression, Angst, PTBS) selbstverständlich nicht umfassend behandelt werden. Deswegen ist eine langfristige, individuelle Nachsorge erforderlich, in deren Kontext die Entwicklung relevanter Problemlagen weiter verfolgt und bei Bedarf eine weiterführende Behandlung eingeleitet werden kann. Auch umfassendere Lebensstiländerungen (z. B. Steigerung der körperlichen Aktivität) können in der Rehabilitation oft lediglich initiiert werden. Die Nachsorge stellt eine vielversprechende Möglichkeit dar, Lebensstiländerungen zu verstetigen und hierdurch die Nachhaltigkeit der medizinischen Rehabilitation zu steigern (Deck et al., 2012).

Hier wird daher Nachsorge als ein integraler Bestandteil der Rehabilitation empfohlen. Die Rehabilitanden sollen von den Mitarbeitern der Reha-Einrichtung individuelle Empfehlungen zur Nachsorge erhalten. Dabei sollen etablierte Strukturen genutzt werden (z. B. Herzgruppe), in deren Rahmen Gesundheitsbildung und psychologische Aspekte Berücksichtigung finden sollten. Die zentrale Instanz für die Initiierung und Koordination weiterer Nachsorgeleistungen ist der Hausarzt. Darüber hinaus kann (in Abstimmung mit dem Rehabilitanden) eine Nachsorge durch einen entsprechend geschulten Mitarbeiter der Einrichtung erfolgen (z. B. telefonisch oder per Internet).

Verknüpfung mit der „Klassifikation therapeutischer Leistungen in der medizinischen Rehabilitation (KTL)“

Rund fünf Jahre nach Abschluss der Entwicklung der Praxisempfehlungen erfolgte eine Verknüpfung der Empfehlungen mit der KTL, Ausgabe 2015 (Deutsche Rentenversicherung, 2014). Falls passend, wurden Codierungsvorschläge für die jeweiligen Interventionen ergänzt, die jedoch keinen Anspruch auf Vollständigkeit erheben können. Vor der Codierung der entsprechenden KTL-Ziffern muss in jedem Fall geprüft werden, ob die entsprechenden in der KTL aufgeführten Qualitätsmerkmale im Einzelfall erfüllt werden. Für die Codierung anhand der KTL sind die dort aufgeführten Qualitätsmerkmale maßgeblich, nicht die Empfehlungen der vorliegenden Praxisempfehlungen.

Danksagung

Wir danken den Experten, die an der Entwicklung der Praxisempfehlungen mitwirkten. Außerdem möchten wir den Kollegen aus den psychologischen Abteilungen sowie den Chefärzten der Rehabilitationseinrichtungen dafür danken, dass sie sich so zahlreich an unseren Befragungen beteiligt haben und hierdurch wichtige Impulse lieferten. Ebenfalls bedanken möchten wir uns bei den Rehabilitanden, die an der Fokusgruppe teilgenommen haben. Unser Dank gilt auch der Deutschen Rentenversicherung Bund, ohne deren Finanzierung dieses Projekt nicht hätte realisiert werden können.

Interessenskonflikte

Alle Experten, die an der Erstellung der Praxisempfehlungen beteiligt waren, füllten eine Erklärung zu möglichen Interessenskonflikten aus, die sich am AWMF-Formular zur Erklärung von Interessenskonflikten im Rahmen von Leitlinienvorhaben orientiert. Von keinem der Experten wurden bedeutsame Interessenskonflikte im Zusammenhang mit der Entwicklung der Praxisempfehlungen angegeben.

Teil A: Psychische Funktionen

Depression und Angst

1

Alle Rehabilitanden sollen im Aufnahmegespräch durch den Arzt mittels geeigneter Screening-Fragen auf Depression und Angst gescreent werden. Hierfür können beispielsweise die Screening-Fragen aus dem PHQ-4² genutzt werden.

Cave: Symptome wie Erschöpfung, Libidoverlust oder Appetitverlust können auch unabhängig von einer Depression auftreten (z. B. postoperativ oder bei einer Herzinsuffizienz). Dies soll beim Depressions-Screening bzw. der Depressions-Diagnostik berücksichtigt werden.

2

Nach **3-4 Tagen** soll bei allen Rehabilitanden eine Statuserhebung anhand eines Fragebogens (z. B. PHQ-9; HADS) durchgeführt werden. Die persönliche Mitteilung des Testergebnisses soll durch den Arzt oder Psychologen erfolgen.

Cave: Symptome wie Erschöpfung, Libidoverlust oder Appetitverlust können auch unabhängig von einer Depression auftreten (z. B. postoperativ oder bei einer Herzinsuffizienz). Dies soll beim Depressions-Screening bzw. der Depressions-Diagnostik berücksichtigt werden.

Abbildung in der KTL 2015

F55 Psychologische Beratung einzeln

G71 Psychotherapie in der somatischen Rehabilitation einzeln

C552 Ärztliche Beratung zu Krankheit und Therapie einzeln

3

Wenn das Screening zu Beginn der Reha oder die Statuserhebung nach 3-4 Tagen **positiv** ausfallen, soll folgendermaßen vorgegangen werden:

(a) Entscheidung durch den Arzt oder den Psychologen, ob die Indikation für eine vertiefende Diagnostik / psychologische (Einzel-)Intervention gegeben ist

(b) Thematisierung in der interdisziplinären Teambesprechung und in der Visite

(c) Verlaufsbeobachtung durch das gesamte Team

(d) Falls ein Rehabilitand mit einem auffälligen Befund ein Gespräch mit dem Psychologen ablehnt, soll der Arzt ein motivierendes Gespräch mit dem Rehabilitanden führen

Abbildung in der KTL 2015

Zu (a): F55 Psychologische Beratung einzeln

G71 Psychotherapie in der somatischen Rehabilitation einzeln

C552 Ärztliche Beratung zu Krankheit und Therapie einzeln

Zu (d): C552 Ärztliche Beratung zu Krankheit und Therapie einzeln

² Die empfohlenen Screening-Fragen sind auf S. 31 f. im Überblick aufgeführt.

4	Das gesamte Reha-Team soll bei allen Rehabilitanden während des Reha-Aufenthaltes auf Symptome einer Depression oder Symptome von Angst achten. Wenn entsprechende Hinweise bemerkt werden, sollen der Arzt oder der Psychologe darüber informiert werden.
5	Für die vertiefende Diagnostik gilt ein Approbationsvorbehalt; sie darf nur von entsprechend qualifizierten Personen durchgeführt werden. Sie kann in Form einer Exploration erfolgen und durch die Anwendung eines Fragebogens (z. B. Beck-Depressions-Inventar) ergänzt werden. Wenn Unsicherheit in Bezug auf die Diagnose oder die Behandlung besteht, sollte ein psychiatrisches, psychotherapeutisches oder psychosomatisches Konsil eingeleitet werden.
Abbildung in der KTL 2015 G71 Psychotherapie in der somatischen Rehabilitation einzeln F55 Psychologische Beratung einzeln	

6	Wenn die vertiefende Diagnostik positiv ausfällt, sollen folgende Maßnahmen erfolgen: (a) Einleitung einer evidenzbasierten Behandlung entsprechend der Störung (b) Thematisierung in der interdisziplinären Teambesprechung und in der Visite (c) Psychoedukation / Beratung (u. a. Information des Rehabilitanden über seine Störung und die Therapiemöglichkeiten) (d) Psychotherapeutisches Einzelgespräch (für psychotherapeutische Einzelgespräche gilt ein Approbationsvorbehalt; sie dürfen nur von entsprechend qualifizierten Personen durchgeführt werden) (e) Motivierung des Rehabilitanden für eine weiterführende Therapie (f) Evtl. Vorbereitung einer weiterführenden (evidenzbasierten) Behandlung im Anschluss an die Rehabilitation (z. B. indem der Rehabilitand über ambulante Therapiemöglichkeiten und Ansprechpartner informiert wird) (g) Dokumentation der Diagnose nach ICD-10 im Entlassbrief (h) Nachsorgeempfehlung im Entlassbrief: ○ Evtl. Empfehlung einer ambulanten Psychotherapie ○ Psychosomatische Grundversorgung durch den Hausarzt ○ Wiederholte Kontrolle (Monitoring) der depressiven Symptomatik bzw. der Angstsymptomatik durch den Hausarzt im dreimonatlichen Abstand, bis keine depressive Symptomatik / Angstsymptomatik mehr vorliegt ○ Falls die Depression / Angst drei Monate nach Ende der Rehabilitation weiter besteht und noch keine weiterführende Behandlung erfolgt: Weiterführende (evidenzbasierte) Behandlung, die durch den Hausarzt initiiert wird. Dies schließt ggf. eine antidepressive Medikation mit ein.
	Abbildung in der KTL 2015 Zu (c),(e),(f): F55 Psychologische Beratung einzeln G71 Psychotherapie in der somatischen Rehabilitation einzeln C552 Ärztliche Beratung zu Krankheit und Therapie einzeln F56 Psychologische Gruppenarbeit störungsspezifisch F575 Psychologische Gruppenarbeit problemorientiert: Umgang mit Angst und Traurigkeit F58 Psychoedukative Gruppenarbeit Zu (d): G71 Psychotherapie in der somatischen Rehabilitation einzeln

7	Am Ende des Reha-Aufenthaltes soll bei allen Rehabilitanden eine Verlaufskontrolle anhand eines Fragebogens (z. B. PHQ-9; HADS) durchgeführt werden. Die Verlaufskontrolle ist sinnvoll, da sich eine depressive Symptomatik auch erst während der Rehabilitation entwickeln kann. Die persönliche Mitteilung des Testergebnisses soll durch den Arzt oder Psychologen erfolgen.
	Abbildung in der KTL 2015 C552 Ärztliche Beratung zu Krankheit und Therapie einzeln F55 Psychologische Beratung einzeln G71 Psychotherapie in der somatischen Rehabilitation einzeln

8	Wenn die Verlaufskontrolle am Ende des Reha-Aufenthaltes auffällige Werte zeigt, sollen folgende Maßnahmen erfolgen: (a) Evtl. Motivierung des Rehabilitanden für eine weiterführende Therapie (b) Evtl. Vorbereitung einer weiterführenden (evidenzbasierten) Behandlung im Anschluss an die Rehabilitation (z. B. indem der Rehabilitand über ambulante Therapiemöglichkeiten und Ansprechpartner informiert wird) (c) Dokumentation des Screening-Befundes bzw. des Verlaufs der depressiven Symptomatik / der Angstsymptomatik im Entlassbrief (d) Nachsorge-Empfehlung im Entlassbrief: ○ Psychosomatische Grundversorgung durch den Hausarzt ○ Wiederholte Kontrolle (Monitoring) der depressiven Symptomatik bzw. der Angstsymptomatik durch den Hausarzt im dreimonatlichen Abstand, bis keine depressive Symptomatik / Angstsymptomatik mehr vorliegt ○ Falls die depressive Symptomatik / Angstsymptomatik drei Monate nach Ende der Rehabilitation weiter besteht und noch keine weiterführende Behandlung erfolgt: Weiterführende (evidenzbasierte) Behandlung, die durch den Hausarzt initiiert wird. Dies schließt ggf. eine antidepressive Medikation mit ein.
	Abbildung in der KTL 2015 Zu (a),(b): F55 Psychologische Beratung einzeln G71 Psychotherapie in der somatischen Rehabilitation einzeln C552 Ärztliche Beratung zu Krankheit und Therapie einzeln

Anpassungsstörung, Akute Belastungsreaktion, Posttraumatische Belastungsstörung

9

Im Aufnahmegespräch soll der Arzt bei allen Rehabilitanden auf Symptome einer Anpassungsstörung (nach ICD-10) achten bzw. diese erfragen. Wenn der Verdacht auf eine Anpassungsstörung besteht, soll folgendermaßen vorgegangen werden:

- (a) Thematisierung in der interdisziplinären Teambesprechung und in der Visite
- (b) Verlaufsbeobachtung durch das gesamte Team
- (c) Psychoedukation / Beratung
- (d) Entscheidung durch den Arzt oder Psychologen, ob Indikation für eine psychologische (Einzel-)Intervention gegeben ist

Abbildung in der KTL 2015

- Zu (c):
- F55 Psychologische Beratung einzeln
 - G71 Psychotherapie in der somatischen Rehabilitation einzeln
 - C552 Ärztliche Beratung zu Krankheit und Therapie einzeln
 - F56 Psychologische Gruppenarbeit störungsspezifisch
 - F575 Psychologische Gruppenarbeit problemorientiert: Umgang mit Angst und Traurigkeit
 - F58 Psychoedukative Gruppenarbeit

10

- (a) Im Aufnahmegespräch soll der Arzt Rehabilitanden identifizieren, die ein potenziell traumatisches Erlebnis hatten (wie z. B. eine Reanimation, Miterleben des Versterbens eines Bettnachbarn, Reoperation in kurzfristigem Abstand, wiederholte ICD-Schockabgabe).
- (b) Falls ein potenziell traumatisches Erlebnis vorliegt, sollen der Arzt oder der Psychologe die Symptome einer akuten Belastungsreaktion (ABR) oder einer Posttraumatischen Belastungsstörung (PTBS) explorieren.
- (c) Bei Verdacht auf eine ABR oder PTBS soll im Rahmen eines psychologischen Einzelgesprächs eine vertiefende, leitlinienorientierte Diagnostik der ABR / PTBS erfolgen (s. beispielsweise Leitlinien der AWMF: <http://www.awmf.org/>; zuletzt gesichtet: November 2011). Für die vertiefende Diagnostik gilt ein Approbationsvorbehalt; sie darf nur von entsprechend qualifizierten Personen durchgeführt werden.

Cave: ABR / PTBS sind selten!

Abbildung in der KTL 2015

- Zu (b):
- F55 Psychologische Beratung einzeln
 - G71 Psychotherapie in der somatischen Rehabilitation einzeln
 - C552 Ärztliche Beratung zu Krankheit und Therapie einzeln
- Zu (c):
- G71 Psychotherapie in der somatischen Rehabilitation einzeln

11	(a) Falls eine ABR oder eine PTBS diagnostiziert wird, soll im Rahmen eines psychologischen Einzelgesprächs eine psychosomatische Grundversorgung (z. B. durch Stabilisierung / Psychoedukation) erfolgen. (b) Außerdem sollen der behandelnde Arzt, der Psychologe sowie das gesamte Team den Verlauf beobachten. (c) Wenn keine Besserung der Symptomatik eintritt, soll eine evidenzbasierte Therapie begonnen bzw. vorbereitet werden.
	Abbildung in der KTL 2015 Zu (a): F55 Psychologische Beratung einzeln G71 Psychotherapie in der somatischen Rehabilitation einzeln C552 Ärztliche Beratung zu Krankheit und Therapie einzeln Zu (c): F55 Psychologische Beratung einzeln G71 Psychotherapie in der somatischen Rehabilitation einzeln C552 Ärztliche Beratung zu Krankheit und Therapie einzeln F56 Psychologische Gruppenarbeit störungsspezifisch F575 Psychologische Gruppenarbeit problemorientiert: Umgang mit Angst und Traurigkeit F58 Psychoedukative Gruppenarbeit
12	Bei Akuter Belastungsreaktion / Posttraumatischer Belastungsstörung, schwerer Depression sowie Herzinsuffizienz mit Beschwerden in Ruhe (NYHA-Stadium IV) muss individuell geprüft werden, ob ein Entspannungstraining im Einzelsetting hilfreich sein könnte. Rehabilitanden mit diesen Problemlagen sollten nicht am Entspannungstraining im Gruppensetting teilnehmen.
	Abbildung in der KTL 2015 F60 Entspannungstraining einzeln

Affektdurchlässigkeit/ -labilität

13	Der Arzt sowie das gesamte Reha-Team sollen bei allen Rehabilitanden während des Reha-Aufenthaltes auf Anzeichen von Affektdurchlässigkeit/ -labilität achten. Wenn solche Anzeichen beobachtet werden, soll der Rehabilitand durch den Arzt oder den Psychologen über die Störung und ihren voraussichtlich passageren Charakter informiert werden. Der Rehabilitand soll außerdem darüber aufgeklärt werden, dass es sich nicht um eine Depression handelt. Eventuell ist eine Einbeziehung der Angehörigen sinnvoll.
	Abbildung in der KTL 2015 F55 Psychologische Beratung einzeln G71 Psychotherapie in der somatischen Rehabilitation einzeln C552 Ärztliche Beratung zu Krankheit und Therapie einzeln C56 Angehörigengespräch krankheitsbezogen einzeln

Kognitive oder Verhaltensstörungen aufgrund einer Schädigung oder Funktionsstörung des Gehirns

14	(a) Bei postoperativen Rehabilitanden (insbesondere nach längeren / wiederholten OP's) und Rehabilitanden mit Z. n. komplizierter Reanimation soll der Arzt im Aufnahmege-spräch auf kognitive oder Verhaltensstörungen aufgrund einer Schädigung oder Funkti-onsstörung des Gehirns achten und diesbezüglich eine Exploration durchführen. Evtl. können Rating-Skalen zur Erfassung von kognitiven oder Verhaltensstörungen zum Einsatz kommen. (b) Außerdem soll das gesamte Team (insbesondere Ärzte, Psychologen und Pflegeperso-nal) bei dieser Gruppe von Rehabilitanden während des Aufenthaltes auf Anzeichen ei-ner kognitiven oder Verhaltensstörung achten. (c) Bei Verdacht auf ein entsprechendes Defizit soll eine orientierende neuropsychologi-sche Untersuchung stattfinden, die folgende Bereiche umfasst: Aufmerksamkeit / Kon-zentration, Visuomotorik, Gedächtnis / Lernfähigkeit, Exekutivfunktionen. Die Differenzialdiagnosen Depression und Demenz sollen besondere Beachtung finden. Bei einem auffälligen Befund der orientierenden neuropsychologischen Untersuchung soll die zeitnahe Einleitung einer umfassenden neurologischen oder neuropsychologi-schen Diagnostik und Behandlung erfolgen.
	Abbildung in der KTL 2015 Zu (c): F55 Psychologische Beratung einzeln G71 Psychotherapie in der somatischen Rehabilitation einzeln C552 Ärztliche Beratung zu Krankheit und Therapie einzeln

Weitere psychische Komorbidität

15	(a) Der Arzt soll bei der Aufnahme aller Rehabilitanden auf das Vorliegen weiterer psychischer Komorbidität achten. Zusätzlich sollen Arzt, Psychologe und das gesamte Reha-Team bei allen Rehabilitanden während des Reha-Aufenthaltes auf Symptome weiterer psychischer Komorbidität achten. (b) Bei Verdacht auf eine psychische Störung soll eine vertiefende Diagnostik erfolgen. Für die vertiefende Diagnostik psychischer Störungen gilt ein Approbationsvorbehalt; sie darf nur von entsprechend qualifizierten Personen durchgeführt werden. Sie kann in Form einer Exploration erfolgen und durch die Anwendung standardisierter Instrumente ergänzt werden. (c) Falls weitere psychische Komorbidität festgestellt wird, soll eine evidenzbasierte Behandlung entsprechend der Störung begonnen bzw. vorbereitet werden.
	Abbildung in der KTL 2015 Zu (b): G71 Psychotherapie in der somatischen Rehabilitation einzeln F55 Psychologische Beratung einzeln Zu (c): F55 Psychologische Beratung einzeln G71 Psychotherapie in der somatischen Rehabilitation einzeln C552 Ärztliche Beratung zu Krankheit und Therapie einzeln F56 Psychologische Gruppenarbeit störungsspezifisch F57 Psychologische Gruppenarbeit problemorientiert F58 Psychoedukative Gruppenarbeit

Akute psychische oder psychosoziale Probleme; Probleme bei der Krankheits- und Krankheitsfolgenbewältigung

16	(a) Bei der Aufnahme soll der Arzt bei allen Rehabilitanden auf folgende Aspekte achten bzw. folgende Themen explorieren: • Akute psychische oder psychosoziale Probleme bzw. Belastungen • Probleme bei der Krankheits- und Krankheitsfolgenbewältigung (b) Zusätzlich soll das gesamte Team bei allen Rehabilitanden während des Reha-Aufenthaltes auf das Vorliegen der o. g. Problemlagen achten. (c) Bei schwerwiegenden Problemen oder Belastungen soll ein psychologisches bzw. psychotherapeutisches Einzelgespräch oder bei Bedarf eine psychologische Krisenintervention erfolgen. Für psychotherapeutische Einzelgespräche gilt ein Approbationsvorbehalt; sie dürfen nur von entsprechend qualifizierten Personen durchgeführt werden.
	Abbildung in der KTL 2015 Zu (c): F55 Psychologische Beratung einzeln G71 Psychotherapie in der somatischen Rehabilitation einzeln

Teil B: Körperfunktionen

Implantierter Kardiofibrillator (ICD)

17

Bei Rehabilitanden mit Z. n. (wiederholter) ICD-Schockabgabe sollen der Arzt oder der Psychologe Symptome einer Akuten Belastungsreaktion bzw. einer Posttraumatischen Belastungsstörung explorieren. In diesem Zusammenhang sollen auch zukunftsbezogene Ängste (z. B. vor erneuter ICD-Schockabgabe) berücksichtigt werden.

Falls Auffälligkeiten festgestellt werden:

- S. Modul Anpassungsstörung, Akute Belastungsreaktion, Posttraumatische Belastungsstörung
- Hinweis auf Selbsthilfegruppen

Abbildung in der KTL 2015

C552 Ärztliche Beratung zu Krankheit und Therapie einzeln

G71 Psychotherapie in der somatischen Rehabilitation einzeln

F55 Psychologische Beratung einzeln

Hypertonie

18	(a) Der Arzt soll bei allen Rehabilitanden mit Hypertonie erfassen, ob eine ausreichende Akzeptanz / Compliance in Bezug auf die Medikamenteneinnahme vorliegt. Wenn dies nicht der Fall ist, sollen Psychoedukation und Adhärenzförderung erfolgen (z. B. durch Aufklärung über erwünschte und unerwünschte Wirkungen der Medikation). (b) Wenn Zusammenhänge zwischen Stress und Hypertonie erkennbar sind, soll eine Zuweisung zum Entspannungstraining und Stressbewältigungstraining erfolgen.
	Abbildung in der KTL 2015 Zu (a): C552 Ärztliche Beratung zu Krankheit und Therapie einzeln F55 Psychologische Beratung einzeln G71 Psychotherapie in der somatischen Rehabilitation einzeln Zu (b): F61 Entspannungstraining in der Gruppe F60 Entspannungstraining einzeln F571 Psychologische Gruppenarbeit problemorientiert: Stressbewältigung C634 Seminar zur Gesundheitsinformation und –förderung: Stress und Stressbewältigung D581 Soziale Arbeit in der Kleingruppe: Umgang mit beruflichen Belastungen und Konflikten am Arbeitsplatz D586 Soziale Arbeit in der Kleingruppe: Training der sozialen Kompetenz D591 Soziale Arbeit in der Gruppe: Umgang mit beruflichen Belastungen und Konflikten am Arbeitsplatz D596 Soziale Arbeit in der Gruppe: Training der sozialen Kompetenz

Herzrhythmusstörungen

19	Der Arzt soll im Rahmen der Aufnahme bei allen Rehabilitanden erfassen, ob Herzrhythmusstörungen vorliegen, die als störend empfunden werden und die trotz Behandlung persistieren. Wenn dies der Fall ist, sollen möglichst durch den Arzt die folgenden psychoedukativen Maßnahmen erfolgen: • Förderung der Akzeptanz (unabänderlicher) Herzrhythmusstörungen • Eventuell: Förderung der Akzeptanz einer (lebenslangen) Medikamenteneinnahme (z. B. von Marcumar ®) sowie unvermeidlicher Nebenwirkungen • Eventuell: Förderung der Akzeptanz eines ICDs
	Abbildung in der KTL 2015 C552 Ärztliche Beratung zu Krankheit und Therapie einzeln

Sexualleben

20	(a) Das Sexualleben soll bei allen Rehabilitanden (d. h. Männern und Frauen) aktiv angesprochen werden. Dies kann durch den Arzt oder Psychologen geschehen. Als Zeitpunkt bieten sich z. B. das Aufnahmegespräch, Informationsveranstaltungen oder Patientenvorträge an. Die empfohlene Gruppengröße der Informationsveranstaltungen / Patientenvorträge liegt bei 10-15 Personen. Die Besprechung des Sexuallebens sollte in andere Themen eingebettet sein („ein Thema unter anderen Themen“). (b) Falls ein Rehabilitand in Bezug auf das Sexualleben weiteren Gesprächsbedarf hat, soll ein Einzelgespräch mit dem Arzt oder Psychologen anberaumt werden.
	Abbildung in der KTL 2015 Zu (b): - C552 Ärztliche Beratung zu Krankheit und Therapie einzeln - F55 Psychologische Beratung einzeln - G71 Psychotherapie in der somatischen Rehabilitation einzeln

Teil C: Umweltfaktoren und personenbezogene Faktoren

Lang andauernde psychosoziale Belastungen

21	Der Arzt soll im Rahmen der Aufnahme bei allen Rehabilitanden erfragen, ob lang andauernde psychosoziale Belastungen (z. B. in der Partnerschaft oder im Beruf) vorliegen. Hierfür können entsprechende Screening-Fragen genutzt werden³. Insbesondere bei Frauen soll zusätzlich danach gefragt werden, ob eine lang andauernde Belastung durch Haus- und Familienarbeit bzw. Doppelbelastung vorliegt. Eine vertiefte Exploration soll durch den Arzt im Rahmen des Aufnahmegesprächs und / oder im Rahmen weiterer Kontakte mit dem Arzt und / oder Psychologen erfolgen. Wenn entsprechende Belastungen vorliegen, sollen folgende Maßnahmen eingeleitet werden: (a) Bei Bedarf: Stressbewältigungstraining (Informationen über entsprechende Schulungsprogramme sind z. B. erhältlich unter http://zentrum-patientenschulung.de/datenbank/; zuletzt gesichtet: November 2011). Das Stressbewältigungstraining soll durch einen Diplom-Psychologen oder einen M.Sc. in Psychologie (konsekutiver Masterstudiengang) geleitet werden. (b) Bei Bedarf: Entspannungstraining (c) Bei Bedarf: Psychologisches Einzelgespräch
	Abbildung in der KTL 2015 Zu (a): F571 Psychologische Gruppenarbeit problemorientiert: Stressbewältigung⁴ Zu (b): F61 Entspannungstraining in der Gruppe F60 Entspannungstraining einzeln Zu (c): F55 Psychologische Beratung einzeln
22	(a) Der Arzt soll im Rahmen der Aufnahme bei allen Rehabilitanden erfragen, ob eine soziale Isolation besteht. Hierfür können beispielsweise Screening-Fragen nach Albus (2008)⁵ genutzt werden. Zusätzlich sollen Arzt, Psychologe und das gesamte Reha-Team bei allen Rehabilitanden während des Reha-Aufenthaltes darauf achten, ob eine soziale Isolation besteht. (b) Wenn ein starker sozialer Rückzug bzw. fehlende soziale Unterstützung festgestellt werden, soll bei Bedarf ein psychologisches Einzelgespräch erfolgen.
	Abbildung in der KTL 2015 Zu (b): F55 Psychologische Beratung einzeln

³ Die empfohlenen Screening-Fragen sind auf S. 31 f. im Überblick aufgeführt.

⁴ Bitte beachten: Die in der KTL 2015 aufgeführten Qualitätsmerkmale sind teilweise nicht deckungsgleich mit den hier empfohlenen Rahmenbedingungen.

⁵ Die empfohlenen Screening-Fragen sind auf S. 31 f. im Überblick aufgeführt.

23

Der Arzt soll im Rahmen der Aufnahme bei allen Rehabilitanden erfragen, ob Belastungen durch Arbeitslosigkeit oder finanzielle Schwierigkeiten vorliegen. Hierfür kann eine entsprechende Screening-Frage⁶ genutzt werden.

Wenn entsprechende Belastungen vorliegen:

- (a) Bei Bedarf: Psychologisches Einzelgespräch
- (b) Bei Bedarf: Beratung durch den Sozialarbeiter

Abbildung in der KTL 2015

- | | | |
|---------|-----|---|
| Zu (a): | F55 | Psychologische Beratung einzeln |
| Zu (b): | D55 | Sozial- und sozialrechtliche Beratung einzeln |
| | D56 | Beratung zur beruflichen bzw. schulischen Integration einzeln |
| | D57 | Beratung zu Nachsorge und weitergehenden Maßnahmen einzeln |
| | D58 | Soziale Arbeit in der Kleingruppe |
| | D59 | Soziale Arbeit in der Gruppe |

⁶ Die empfohlenen Screening-Fragen sind auf S. 31 f. im Überblick aufgeführt.

Problemlagen in Bezug auf Erwerbstätigkeit

24

Der Arzt soll im Rahmen der Aufnahme bei allen dafür in Frage kommenden Rehabilitanden die subjektive Erwerbsprognose erfassen. Hierfür können beispielsweise die Screening-Fragen aus der SPE-Skala genutzt werden⁷. Auch der Einsatz anderer Screening-Instrumente ist möglich (z. B. SIBAR, SIMBO oder das Würzburger Screening; siehe auch <http://www.medizinisch-berufliche-orientierung.de/erfassung-und-beschreibung-arbeits-und-berufsbezogener-problemlagen/diagnostik-screening>; zuletzt gesichtet: November 2011).

Bei einem auffälligen Screening-Befund soll eine Exploration der beruflichen Problemlagen durch den Arzt oder den Sozialarbeiter stattfinden.

Bei besonderen beruflichen Problemlagen:

- (a) Berufsbezogenes Beratungsangebot
- (b) Nach Möglichkeit medizinisch-beruflich orientierte Rehabilitation (MBOR)
 - Informationen zur MBOR sind erhältlich unter <http://www.medizinisch-berufliche-orientierung.de/>; zuletzt gesichtet: November 2011
 - Das Anforderungsprofil der Deutschen Rentenversicherung zur Durchführung der MBOR kann unter folgendem Link eingesehen werden:
www.reha-wissenschaften-drv.de → Reha-Konzepte → Konzepte → Medizinisch-beruflich orientierte Rehabilitation (MBOR)

Falls psychologisch relevante Problemlagen in Bezug auf die Erwerbstätigkeit vorliegen, sollen folgende Maßnahmen eingeleitet werden:

- (c) Frühzeitige Einbeziehung der Psychologischen Abteilung. Bei Bedarf: Psychologisches Einzelgespräch
- (d) Bei Bedarf: Vertiefende Diagnostik (z. B. in Form einer Exploration, evtl. ergänzt durch einen Fragebogen wie z. B. den „AVEM“ oder den „WAI“)
- (e) Evtl. fachspezifischer Beitrag zur sozialmedizinischen Leistungsbeurteilung

⁷ Die empfohlenen Screening-Fragen sind auf S. 31 f. im Überblick aufgeführt.

Abbildung in der KTL 2015

- Zu (a):
- C551 Ärztliche sozialmedizinische Beratung einzeln
 - C58 Gespräche mit Rehabilitand und Betriebsangehörigen
 - D55 Sozial- und sozialrechtliche Beratung einzeln
 - D56 Beratung zur beruflichen bzw. schulischen Integration einzeln
 - D58 Soziale Arbeit in der Kleingruppe
 - D59 Soziale Arbeit in der Gruppe
- Zu (b):
- Eine Übersicht über MBOR-Angebote und Angaben zu ihrer Abbildung in der KTL finden sich im Anforderungsprofil der Deutschen Rentenversicherung zur Durchführung der MBOR. Die Broschüre ist unter folgendem Link abrufbar: www.reha-wissenschaften-drk.de → Reha-Konzepte → Konzepte → Medizinisch-beruflich orientierte Rehabilitation (MBOR)
- Zu (c):
- F552 Psychologische Beratung bei berufsbezogenen Problemlagen einzeln
- Zu (d):
- F55 Psychologische Beratung einzeln
 - C55 Ärztliche Beratung und Intervention einzeln
 - E60 Verhaltensbeobachtung zur arbeitsbezogenen Leistungsbeurteilung einzeln
 - E61 Verhaltensbeobachtung zur arbeitsbezogenen Leistungsbeurteilung in der Kleingruppe
 - E62 Belastungserprobung einzeln

Rauchen

Der Arzt soll im Rahmen der Aufnahme bei allen Rehabilitanden den Raucherstatus erfragen (Raucher; Nicht-Raucher; Ex-Raucher, d. h. rauchfrei seit > 6 Monaten).

Wenn der Rehabilitand Raucher ist, sollen folgende Maßnahmen erfolgen:

- (a) Die Bereitschaft, mit dem Rauchen aufzuhören, soll bestimmt werden
- (b) Den Rauchern soll dringend empfohlen werden, mit dem Rauchen aufzuhören (Empfehlung erfolgt durch das gesamte Team)
- (c) Das gesamte Team soll das Konzept der „Motivierenden Gesprächsführung“ umsetzen
- (d) Die Raucher sollen (z. B. im Rahmen einer Informationsveranstaltung oder durch Informationsmaterial) darüber unterrichtet werden, welche Angebote es zur Tabakentwöhnung gibt und wie die Angebote aufgebaut sind
- (e) Die Raucher sollen (auf freiwilliger Basis) an einer verhaltenstherapeutisch orientierten Tabakentwöhnung teilnehmen (einzeln oder Gruppe) (Informationen über entsprechende Schulungsprogramme sind z. B. erhältlich unter <http://zentrum-patientenschulung.de/datenbank/>; zuletzt gesichtet: November 2011). Gegebenenfalls kann zusätzlich eine Nikotin-Ersatz-Therapie oder eine pharmakologische Intervention erfolgen.
- (f) Alle Rehabilitanden, die in den letzten sechs Monaten eine Tabakabhängigkeit zeigten, sollen über ambulante Hilfsangebote zur Tabakentwöhnung informiert werden, wie z. B. über mögliche Präventionskurse der Krankenkassen oder über Angebote im Internet wie beispielsweise: www.rauch-frei.info; www.dkfz.de; www.bzga.de (zuletzt gesichtet: November 2011).
- (g) Bei jedem Hausarztbesuch im Anschluss an die Rehabilitation soll ein Monitoring in Bezug auf den Raucherstatus erfolgen. Die Empfehlung hierfür wird im Entlassbericht der Reha-Einrichtung gegeben.

25

Abbildung in der KTL 2015

Zu (a),(b):	C552	Ärztliche Beratung zu Krankheit und Therapie einzeln
	F55	Psychologische Beratung einzeln
	G71	Psychotherapie in der somatischen Rehabilitation einzeln
Zu (d):	C595	Vortrag: Alltagsdrogen
	C60	Vortrag: Krankheitsspezifische Informationen
	C62	Seminar: Motivationsförderung und Selbstmanagement
	C635	Seminar zur Gesundheitsinformation und –förderung: Alltagsdrogen
	C64	Seminar: Krankheitsspezifische Information
Zu (e):	F578	Psychologische Gruppenarbeit problemorientiert: Tabakentwöhnung
	F55	Psychologische Beratung einzeln
	G71	Psychotherapie in der somatischen Rehabilitation einzeln
	C552	Ärztliche Beratung zu Krankheit und Therapie einzeln
Zu (f):	F578	Psychologische Gruppenarbeit problemorientiert: Tabakentwöhnung
	F55	Psychologische Beratung einzeln
	G71	Psychotherapie in der somatischen Rehabilitation einzeln
	C552	Ärztliche Beratung zu Krankheit und Therapie einzeln
	D57	Beratung zu Nachsorge und weitergehenden Maßnahmen einzeln
	D584	Soziale Arbeit in der Kleingruppe: Nachsorge und weitergehende Maßnahmen
	D594	Soziale Arbeit in der Gruppe: Nachsorge und weitergehende Maßnahmen

Bewegungsmangel

26	Der Arzt und / oder der Physio- oder Sporttherapeut sollen bei allen Rehabilitanden erfragen, ob ein Bewegungsmangel vorliegt. Ausreichende Bewegung heißt laut den aktuellen Empfehlungen der WHO (2010) für Erwachsene ab 18 Jahren: • Mindestens 150 Minuten moderat-intensive aerobe körperliche Aktivitäten (z. B. zügiges Gehen) pro Woche <i>oder</i> • Mindestens 75 Minuten intensive aerobe körperliche Aktivität (z. B. Laufen) • Intensive und moderate Aktivitäten können gemischt werden • Dauer einer Einheit mindestens 10 Minuten • Für zusätzliche Gesundheitseffekte sollten Erwachsene das Ausmaß an moderat-intensiver körperlicher Aktivität auf 300 Minuten pro Woche ausweiten oder 150 Minuten pro Woche intensiv aerob körperlich aktiv sein • Zusätzlich 2 x pro Woche Kräftigungsübungen für alle großen Muskelgruppen Für Erwachsene ab 65 Jahren gibt es zwei zusätzliche Empfehlungen der WHO (2010): • Erwachsene dieser Altersgruppe mit eingeschränkter Mobilität sollen zur Verbesserung des Gleichgewichts und zur Sturzprophylaxe mindestens 3 Mal pro Woche körperlich aktiv sein • Wenn Erwachsene dieser Altersgruppe aufgrund ihres Gesundheitszustands die empfohlene Menge an körperlicher Aktivität nicht durchführen können, sollen sie körperlich so aktiv sein, wie ihre Fähigkeiten und Verfassung es erlauben Falls Bewegungsmangel vorliegt, sollen folgende Maßnahmen durchgeführt werden: (a) Einsatz von psychologisch fundierten Interventionen zur Verhaltensänderung (z. B. Handlungs- und Bewältigungsplanung) z. B. durch den Physio- oder Sporttherapeuten (b) Das gesamte Team soll das Konzept der „Motivierenden Gesprächsführung“ umsetzen (c) Der Rehabilitand soll gegen Ende der Rehamaßnahme im Rahmen eines Planungsgesprächs (z. B. mit dem Physio- oder Sporttherapeuten) eine möglichst detaillierte Handlungs- und Bewältigungsplanung für die Zeit nach der Rehabilitation schriftlich formulieren. Der Einbezug der Angehörigen kann hierbei hilfreich sein. (d) Motivierung des Rehabilitanden zur Teilnahme an einer ambulanten Herzgruppe (e) Nachsorgeempfehlung im Entlassbericht: ○ Empfehlung zur Teilnahme an einer ambulanten Herzgruppe ○ Bei jedem Hausarztbesuch im Anschluss an die Rehabilitation soll ein Monitoring in Bezug auf ausreichende Bewegung erfolgen. Im Rahmen dieser Nachsorgegespräche soll die Erreichung der vereinbarten Bewegungsziele besprochen werden. Die Nutzung von Bewegungstagebüchern kann hierfür die Grundlage bilden. Bei Bedarf erfolgt eine Anpassung der Handlungs- und Bewältigungsplanung oder Psychoedukation.
-----------	---

Abbildung in der KTL 2015

Zu (a):	A	Sport- und Bewegungstherapie (ganzes Kapitel)
	B	Physiotherapie (ganzes Kapitel)
	C703	Standardisierte Schulung bei koronarer Herzkrankheit
	C704	Nicht-standardisierte Schulung bei koronarer Herzkrankheit
Zu (c),(d):	L55	Bewegung und Sport in der Freizeit
	C703	Standardisierte Schulung bei koronarer Herzkrankheit
	C704	Nicht-standardisierte Schulung bei koronarer Herzkrankheit
	C62	Seminar: Motivationsförderung und Selbstmanagement
	C633	Seminar zur Gesundheitsinformation und –förderung: Bewegung und körperliches Training
	C593	Vortrag: Bewegung und körperliches Training
	C64	Seminar: Krankheitsspezifische Information
	C60	Vortrag: Krankheitsspezifische Information
	C552	Ärztliche Beratung zu Krankheit und Therapie einzeln
	C56	Angehörigengespräch krankheitsbezogen einzeln
	C57	Angehörigengespräch krankheitsbezogen in der Gruppe
	D57	Beratung zu Nachsorge und weitergehenden Maßnahmen einzeln
	H55	Anleitung zum Eigentaining einzeln

Fehlernährung

27	Der Arzt soll bei allen Rehabilitanden im Rahmen der Aufnahme feststellen, ob Fehlernährung vorliegt. Wenn dies der Fall ist, sollen folgende Maßnahmen anberaumt werden: (a) Einsatz von psychologisch fundierten Interventionen zur Verhaltensänderung (z. B. Handlungs- und Bewältigungsplanung) z. B. durch den Ökotrophologen oder Diätassistenten (b) Das gesamte Team soll das Konzept der „Motivierenden Gesprächsführung“ umsetzen (c) Die Rehabilitanden sollen gegen Ende der Rehamaßnahme im Rahmen eines Planungsgesprächs (z. B. mit dem Ökotrophologen oder Diätassistenten) eine möglichst detaillierte Handlungs- und Bewältigungsplanung für die Zeit nach der Rehabilitation schriftlich formulieren. Der Einbezug der Angehörigen kann hierbei sinnvoll sein. (d) Bei jedem Hausarztbesuch im Anschluss an die Rehabilitation soll ein Monitoring in Bezug auf die Ernährung erfolgen. Die Empfehlung hierfür wird im Entlassbericht der Reha-Einrichtung gegeben. Im Rahmen dieser Nachsorgegespräche soll die Erreichung der vereinbarten Ernährungsziele besprochen werden. Die Nutzung von Ernährungstagebüchern kann hierfür die Grundlage bilden. Bei Bedarf erfolgt eine Anpassung der Handlungs- und Bewältigungsplanung oder Psychoedukation.
	Abbildung in der KTL 2015 Zu (a),(c): - M55 Abstimmung einer definierten Kostform - M59 Ernährungsberatung einzeln - M60 Ernährungsberatung in der Gruppe - M62 Lehrküche in der Gruppe - M63 Weitere praktische Übungen zum Ernährungsverhalten in der Gruppe - F573 Psychologische Gruppenarbeit problemorientiert: Ernährungsverhalten - C552 Ärztliche Beratung zu Krankheit und Therapie einzeln - C592 Vortrag: Gesunde Ernährung - C632 Seminar zur Gesundheitsinformation und -förderung: Gesunde Ernährung - C56 Angehörigengespräch krankheitsbezogen einzeln - D60 Angehörigengespräch psychosozial einzeln

Ungenügende Adhärenz

Der Arzt sowie das gesamte Reha-Team sollen bei allen Rehabilitanden während des Reha-Aufenthaltes auf eine ausreichende Adhärenz achten. Wenn eine ungenügende Adhärenz vorliegt, sollen folgende Maßnahmen erfolgen:

- 28**
- (a) Gespräch mit dem Arzt
 - (b) Evtl. psychologisches Einzelgespräch
 - (c) Bei Bedarf soll versucht werden, die Akzeptanz einer lebenslangen Medikamenteneinnahme (sowie unvermeidlicher Nebenwirkungen) bei den Rehabilitanden zu fördern
 - (d) Das gesamte Team soll das Konzept der „Motivierenden Gesprächsführung“ umsetzen

Anmerkung: Eine niedrige Adhärenz kann damit zusammenhängen, dass dem Rehabilitanden der Nutzen einzelner Interventionen nicht klar ist. Bei geringer Adhärenz soll daher sichergestellt werden, dass der Nutzen der Interventionen deutlich wird.

Abbildung in der KTL 2015

Zu (a),(c): C552 Ärztliche Beratung zu Krankheit und Therapie einzeln

Zu (b),(c): F55 Psychologische Beratung einzeln

G71 Psychotherapie in der somatischen Rehabilitation einzeln

Auf einen Blick: Empfohlene Screening-Fragen⁸ für Rehabilitanden mit KHK

PHQ-4 (Löwe et al., 2010)

Wie oft fühlten Sie sich im Verlauf der <u>letzten 2 Wochen</u> durch die folgenden Beschwerden beeinträchtigt?	Überhaupt nicht	An einzelnen Tagen	An mehr als der Hälfte der Tage	Beinahe jeden Tag
Wenig Interesse oder Freude an Ihren Tätigkeiten	☐	☐	☐	☐
Niedergeschlagenheit, Schwermut oder Hoffnungslosigkeit	☐	☐	☐	☐
Nervosität, Ängstlichkeit oder Anspannung	☐	☐	☐	☐
Nicht in der Lage sein, Sorgen zu stoppen oder zu kontrollieren.	☐	☐	☐	☐

Skala zur Messung der subjektiven Prognose der Erwerbstätigkeit (SPE-Skala) (Mittag & Raspe, 2003)

Wenn Sie an Ihren derzeitigen Gesundheitszustand und Ihre berufliche Leistungsfähigkeit denken:

1. Glauben Sie, dass Sie **Ihre jetzige (letzte) Tätigkeit bis zum Erreichen des Rentenalters ausüben** können? *(Bitte nur ein Kästchen ankreuzen)*

☐ sicher ☐ eher ja ☐ unsicher ☐ eher nein ☐ auf keinen Fall

2. Sehen Sie durch Ihren derzeitigen Gesundheitszustand Ihre **allgemeine Erwerbsfähigkeit** dauerhaft gefährdet?

☐ nein ☐ ja

3. Tragen Sie sich zur Zeit mit dem Gedanken, einen **Rentantrag aus Gesundheitsgründen** (Erwerbsminderungsrente) zu stellen?

☐ nein ☐ ja ☐ habe bereits einen Rentenantrag gestellt

⁸ Alle hier aufgeführten Fragen / Instrumente dürfen lizenzfrei verwendet werden.

Soziale Isolation (Albus, 2008)

	ja	nein
Leben Sie alleine?	☐	☐
Haben Sie eine oder mehrere Personen, denen Sie vertrauen können und auf deren Hilfe Sie im Falle einer Krankheit zählen können?	☐	☐

Lang andauernde psychosoziale Belastungen (angelehnt an Albus, 2008 und Küch et al., 2011)

	Überhaupt nicht	Eher weniger	Eher mehr	Stark oder sehr stark
Haben Sie ernsthafte Probleme mit Ihrem Lebenspartner, Ihren Kindern oder Ihrer Familie?	☐	☐	☐	☐
Leiden Sie unter besonderen beruflichen Belastungen (z. B. Zeitdruck, Überforderung, Konflikte, Angst um Arbeitsplatz, Unzufriedenheit mit der Arbeit, anderes)?	☐	☐	☐	☐
Leiden Sie unter Arbeitslosigkeit oder finanziellen Schwierigkeiten?	☐	☐	☐	☐

Eine Auswahl aktueller Informationen und Broschüren der Deutschen Rentenversicherung (Stand: März 2018)

Die Deutsche Rentenversicherung stellt zahlreiche Informationsmaterialien zur Verfügung, um die Arbeit in den Rehabilitationseinrichtungen fachlich zu unterstützen. Diese Materialien sind über folgenden **trägerübergreifenden Shortlink der Deutschen Rentenversicherung** abrufbar:

www.reha-einrichtungen-drv.de → Infos für Reha-Einrichtungen

Weitere Materialien, die die **Deutschen Rentenversicherung Bund** zur Verfügung stellt, finden Sie hier:

www.reha-einrichtungen.de → Infos für Reha-Einrichtungen

Die folgende Auflistung stellt nur eine kleine Auswahl der verfügbaren Materialien zu verschiedenen Themen dar. Weiterführende Informationen finden Sie zum Beispiel auf den Internetseiten der einzelnen Rentenversicherungsträger.

Psychologie in der medizinischen Rehabilitation

www.reha-einrichtungen-drv.de → Infos für Reha-Einrichtungen → Infos für das Reha-Team → Arbeitsfelder → Psychologie

Hier finden sich Informationen und Broschüren zu den Themen:

- Praxisempfehlungen für psychologische Interventionen in der Rehabilitation
- Diagnostik psychischer Komorbidität
- Positionspapier der Deutschen Rentenversicherung zur Bedeutung psychischer Erkrankungen in der Rehabilitation und bei Erwerbsminderung

Eine **Sammlung verschiedener Informationen** der Deutschen Rentenversicherung Bund **zur psychologischen Arbeit in der medizinischen Rehabilitation**, die regelmäßig aktualisiert wird, umfasst die Broschüre:

- Deutsche Rentenversicherung (2017). Reader Psychologie – aktuelle Informationen zur psychologischen Arbeit in der medizinischen Rehabilitation. Berlin: Deutsche Rentenversicherung (www.reha-einrichtungen.de → Infos für Reha-Einrichtungen → Infos für das Reha-Team → Arbeitsfelder → Psychologie)

Patientenschulung, Beratung und Partizipative Entscheidungsfindung

**www.reha-einrichtungen-drv.de → Infos für Reha-Einrichtungen
→ Patientenschulung & Beratung**

Hier finden sich Informationen und Broschüren zu den Themen:

- Patientenschulung
- Indikationsübergreifende Gesundheitsbildung
- Partizipation und Zielvereinbarung

www.reha-einrichtungen.de → Infos für Reha-Einrichtungen → Patientenschulung & Beratung → Gesundheitstraining

Hier finden sich Curricula für standardisierte Patientenschulungen des Gesundheitstrainingsprogramms der Deutschen Rentenversicherung Bund.

Medizinisch-beruflich orientierte Rehabilitation (MBOR)

www.reha-einrichtungen-drv.de → Infos für Reha-Einrichtungen → Grundlagen & Anforderungen → Anforderungsprofile

Hier finden sich verschiedene Broschüren zur MBOR, z.B.:

- Anforderungsprofil zur Durchführung der Medizinisch-beruflich orientierten Rehabilitation (MBOR)
- Praxishandbuch: Arbeits- und berufsbezogene Orientierung in der medizinischen Rehabilitation

Nachsorge

www.reha-einrichtungen-drv.de → Infos für Reha-Einrichtungen → Nachsorge

Hier finden sich z.B. das Rahmenkonzept zur Reha-Nachsorge der Deutschen Rentenversicherung sowie Fachkonzepte zur „T-RENA“, „IRENA“ und „Psy-RENA“

Literatur

- Albus, C. (2008). Allgemeine Anamnese. In: C. Herrmann-Lingen, C. Albus & G. Titscher (Hrsg.), Psychokardiologie: Ein Praxisleitfaden für Ärzte und Psychologen (S. 185-191). Köln: Deutscher Ärzte-Verlag.
- Deck, R., Schramm, S. & Hüppe, A. (2012). Begleitete Eigeninitiative nach der Reha („neues Credo“) – ein Erfolgsmodell? Rehabilitation, 51, 316-325.
- Deutsche Rentenversicherung (2014). KTL. Klassifikation therapeutischer Leistungen in der medizinischen Rehabilitation. Ausgabe 2015. Berlin: Deutsche Rentenversicherung. URL: www.ktl-drv.de, Abruf: 28.03.2018.
- Deutsche Rentenversicherung (2015). Medizinisch-beruflich orientierte Rehabilitation. Anforderungsprofil zur Durchführung der Medizinisch-beruflich orientierten Rehabilitation (MBOR) im Auftrag der Deutschen Rentenversicherung. Berlin: Deutsche Rentenversicherung. Verfügbar unter: www.deutsche-rentenversicherung-bund.de → Infos für Experten → Sozialmedizin & Forschung → Reha-Wissenschaften → Reha-Konzepte → Konzepte → Medizinisch-beruflich orientierte Rehabilitation (MBOR), Abruf: 28.03.2018.
- Deutsche Rentenversicherung (2011). Psychische Komorbidität – Leitfaden zur Implementierung eines psychodiagnostischen Stufenplans in der medizinischen Rehabilitation. Verfügbar unter: www.deutsche-rentenversicherung-bund.de → Infos für Experten → Sozialmedizin & Forschung → Reha-Wissenschaften → Reha-Konzepte → Konzepte → Psychologie in der medizinischen Rehabilitation → Psychische Komorbidität, Abruf: 28.03.2018.
- Deutsche Rentenversicherung Bund (2010). Strukturqualität von Reha-Einrichtungen – Anforderungen der Deutschen Rentenversicherung Bund. URL: http://www.deutsche-rentenversicherung-bund.de/cae/servlet/contentblob/120564/publicationFile/11644/2010_Brosch%C3%BCre_Strukturanforderungen.pdf, Abruf: 8.11.2011.
- Dunn, C., DeRoo, L. & Rivara, F. P. (2001). The use of brief interventions adapted from motivational interviewing across behavioural domains: a systematic review. Addiction, 96, 1725-1742.
- Härter, M., Woll, S., Reuter, K., Wunsch, A. & Bengel, J. (2004). Recognition of psychiatric disorders in musculoskeletal and cardiovascular rehabilitation patients. Archives of Physical Medicine and Rehabilitation, 85, 1192-1197.
- Küch, D., Arndt, S., Grabe, A., Manthey, W., Schwabe, M. & Fischer, D. (2011). UKS – Ultra-Kurz-Screening psychosozialer Problemlagen zur bedarfsorientierten Angebotszuweisung in der somatischen Rehabilitation. In: Arbeitskreis Klinische Psychologie in der Rehabilitation (BDP) (Hrsg.), Psychologische Betreuung im Krankheitsverlauf (96-106). Bonn : Deutscher Psychologen Verlag.
- Löwe, B., Wahl, I., Rose, M., Spitzer, C., Glaesmer, H., Wingenfeld, K., Schneider, A. & Brähler, E. (2010). A 4-item measure of depression and anxiety: validation and standardization of the Patient Health Questionnaire-4 (PHQ-4) in the general population. Journal of Affective Disorders, 122, 86-95.
- Miller, W. R. & Rollnick, S. (2009). Motivierende Gesprächsführung (3. Aufl.). Freiburg: Lambertus-Verlag.
- Mittag, O. & Grande, G. (2008). PatientInnenorientierung in der Rehabilitation – Die Genderperspektive. Rehabilitation, 47, 98-108.

- Mittag, O. & Raspe, H. (2003). Eine kurze Skala zur Messung der subjektiven Prognose der Erwerbstätigkeit: Ergebnisse einer Untersuchung an 4279 Mitgliedern der gesetzlichen Rentenversicherung zu Reliabilität (Guttman-Skalierung) und Validität der Skala. *Rehabilitation*, 42, 169-174.
- Mittag, O. & Reese, C. (2013). Die Entwicklung von Praxisempfehlungen für psychologische Interventionen in der Rehabilitation von Patienten mit koronarer Herzkrankheit: Methoden und Ergebnisse. *Die Rehabilitation*, 52, 266-272.
- Mittag, O., Reese, C., Gülich, M. & Jäckel, W. H. (2012). Strukturen und Praxis der Psychologischen Abteilungen in der orthopädischen und kardiologischen Rehabilitation: Vergleich zwischen ambulanten und stationären Einrichtungen in Deutschland. *Das Gesundheitswesen*, 74, 778-783.
- Reese, C., Jäckel, W. H. & Mittag, O. (2012). Die somatische Rehabilitation als Arbeitsfeld für Psychologen: Ergebnisse einer bundesweiten Befragung zu Strukturen und Praxis in der stationären orthopädischen und kardiologischen Rehabilitation. *Die Rehabilitation*, 51, 142-150.
- Reese, C., Spieser, A. & Mittag, O. (2012). Psychologische Interventionen in der Rehabilitation von Patienten mit koronarer Herzerkrankung: Zusammenfassung der Evidenz und der Empfehlungen aus systematischen Übersichtsarbeiten und Leitlinien. *Die Rehabilitation*, 51, 405-414.
- Rubak, S., Sandbaek, A., Lauritzen, T. & Christensen, B. (2005). Motivational interviewing: a systematic review and meta-analysis. *British Journal of General Practice*, 55, 305-312.
- Sackett, D. L., Straus, S. E., Richardson, W. S., Rosenberg, W. & Haynes, R. B. (2000). *Evidence-based medicine*. Edinburgh: Churchill Livingstone.
- Sniehotta, F. F., Scholz, U., Schwarzer, R., Fuhrmann, B., Kiwus, U. & Völler, H. (2005). Long-term effects of two psychological interventions on physical exercise and self-regulation following coronary rehabilitation. *International Journal of Behavioral Medicine*, 12, 244-255.
- Verplanken, B., & Faes, S. (1999). Good intentions, bad habits and the effects of forming implementation intentions on behavior and cognition. *European Journal of Social Psychology*, 29, 591-604.
- World Health Organisation (2010). Global recommendations on physical activity for health. URL: http://www.who.int/dietphysicalactivity/factsheet_recommendations/en/index.html, Abruf: 9.11.2011.