




**UNIVERSITÄTS
KLINIKUM** FREIBURG

CCCF COMPREHENSIVE CANCER CENTER FREIBURG

Ösophaguskarzinom und Magenkarzinom


Verantwortlich: PD Dr. H. Becker, Prof. H. Bertz, Dr. E. Gkika,
Dr. S. Heeg, Prof. Dr. J. Höppner, Dr. S. Kirste
Freigabe: interdisziplinärer Qualitätszirkel ZGT
Stand 07/19, gültig bis 07/21
Version 5.0

Plattenepithelkarzinom Ösophagus



* High-Risk-Kriterien: G3, R1, L1, V1, Ulzeration >2cm

Adenokarzinom Ösophagus + GEJ



¹ High Risk-Kriterien: G3, R1, L1, V1, Ulzeration >2cm

² Adjuvante Chemotherapie z.B. mit CAPOX (CLASSIC Studie), adjuvante Radiochemotherapie nur bei nicht ausreichend radikaler OP

³ Gemäß McDonald NEJM 2001, nach individueller Beratung


⁴ Wenn kein Tumorkontakt zur Z-Linie obligat oder auch fakultativ alternativ (cT3-4 od. großem Primarius) neoadjuvante RChT 41,4Gx Carboplatin/Paclitaxel

⁵ singuläre Lebermetas + limitierte Peritonealkarzinose

⁶ HER2 Positiv : IHC 3+ bzw. IHC 2+ und FISH+

⁷ FLO statt FLOT bei >65/70J, reduziertem AZ, geringerem Remissionsdruck und/oder Komorbiditäten

Magenkarzinom



¹ High Risk-Kriterien: G3, R1, L1, V1, Ulzeration >2cm

² Adjuvante Chemotherapie z.B. mit CAPOX (CLASSIC Studie), adjuvante Radiochemotherapie nur bei nicht ausreichend radikaler OP

³ Gemäß McDonald NEJM 2001, nach individueller Beratung

⁴ singuläre Lebermetastasen + limitierte Peritonealkarzinose

⁵ HER2 Positiv : IHC 3+ bzw. IHC 2+ und FISH+

⁶ FLO statt FLOT bei >65/70J, reduziertem AZ, geringerem Remissionsdruck und/oder Komorbiditäten