



**UNIVERSITÄTS
KLINIKUM** FREIBURG


CCCF COMPREHENSIVE CANCER CENTER FREIBURG

Malignes Pleuramesotheliom (MPM)

Verantwortlich: PD Dr. Gkika, Prof. Passlick,
Dr. Rawluk, Prof. Waller, Dr. Schmid
Freigabe: interdisziplinärer Qualitätszirkel
Stand 07/2019, gültig bis 07/2021
Version 1


Malignes Pleuramesotheliom (MPM)

Diagnostischer Algorithmus bei V. a. MPM



Malignes Pleuramesotheliom (MPM)

Therapie Stadium I-III und epitheloide Histologie



Malignes Pleuramesotheliom (MPM)

Therapie Stadium I-III und epitheloide Histologie

* die onkologische Resektabilität ist definiert durch die zu erwartende vollständige Entfernung von allem makroskopisch sichtbarem und palpablem Tumorgewebe (Zytoreduktion).

Bei Vorliegen eines N2 Status besteht keine onkologische Resektabilität

** die Auswahl der Operation (P&D bzw. erweiterte P&D und HITOC oder EPP) erfolgt durch einen erfahrenen Thoraxchirurgen sowie in einem interdisziplinären Tumorboard unter Berücksichtigung der kardiorespiratorischen Reserve, der Tumorausdehnung und geplanten multimodalen Therapien mit dem Ziel der Entfernung allen makroskopisch sichtbaren Tumorgewebes

*** In ausgewählten Fällen kann auch Patienten mit biphasischer Histologie unter Berücksichtigung der genannten Kriterien eine Operation angeboten werden.

Malignes Pleuramesotheliom (MPM)

Therapie Stadium IV

