

BSZ-203-MB06 Spenderzulassung – Häufigkeit und Menge der Spenden

Regel-Spendeabstände zur Vorspende	Rückstellfrist
Abstand Vollblutspende nach Plasmaspende	1 Woche
Abstand Vollblutspende nach Thrombozytenspende	2 Wochen
Abstand Vollblutspende nach Vollblutspende	Männer 8 Wochen ¹ , Frauen: 12 Wochen ¹
Abstand Vollblutspende nach Doppelerythrozyten-Spende	Männer 4 Monate ¹ , Frauen: ½ Jahr ¹
Abstand Doppelerythrozyten-Spende nach Doppelerythrozyten-Spende	Männer 4 Monate ¹ , Frauen: ½ Jahr ¹
Abstand Plasmaspende nach Vollblutspende	1 Woche
Abstand Plasmaspende nach Plasmaspende	1 Woche
Abstand Plasmaspende nach Thrombozytenspende	1 Woche
Abstand Thrombozytenspende nach Vollblutspende	2 Wochen
Abstand Thrombozytenspende nach Thrombozytenspende	2 Wochen
Abstand Thrombozytenspende nach Plasmaspende	1 Woche

Menge und Abstand einer erneuten Vollblutspende/Doppelerythrozyt-Apherese zu folgender vorausgegangenem Spende gemäß Richtlinie zur Gewinnung von Blut und Blutbestandteilen

Vollblutspende/Doppelerythrozyt-Apherese ⁴		
zu Vollblutspenden	Frauen: max. 2 L/Jahr (entsprechend 1000ml Ery ²) Männer: max. 3 L/Jahr (entsprechend 1500ml Ery ²)	Soll ≥ 12 Wochen ¹ Männer: ≥ 8 Wochen (min. 56 Tage) ¹
zu Doppelerythrozyt-Apherese	Frauen: max. 2 mal/Jahr (entsprechend 1000ml Ery ²) Männer: max. 3 mal/Jahr (entsprechend 1500ml Ery ²)	Muss ≥ 16 Wochen (min. 112 Tage) ¹
zu Thrombozytapherese		48 Stunden ³ <u>intern gilt als Richtwert: ≥ 2 Wochen</u>
Plasmapherese		2 spendefreie Tage ³ <u>intern gilt als Richtwert: ≥ 1 Woche</u>

Thrombozytapherese		
zu Vollblutspenden oder Doppelerythrozyt-Apherese	26/Jahr	<u>intern gilt als Richtwert: ≥ 2 Wochen</u>
Thrombozytapherese	26/Jahr	nach 5 Spenden (ohne gleichzeitige Plasmasammlung) im Tagesrhythmus 3 Monate Pause bis zur nächsten Serie, 2 Wochen zur nächsten Einzelspende <u>intern gilt als Richtwert: Soll ≥ 2 Wochen</u>
Plasmapherese	26/Jahr	2 spendefreie Tage ³ <u>intern gilt als Richtwert: Soll ≥ 1 Woche</u>

Plasmapherese		
zu allen anderen Spenden	max. 45 mal/Jahr	2 spendefreie Tage ³ <u>intern gilt als Richtwert: Soll ≥ 1 Woche</u>

¹ Patienten mit medikamentös induzierter Polyglobulie unter Steroidtherapie und Patienten mit bekannter, eingestellter Hämochromatose (normale Ferritin-Werte) und können zur Erhaltungstherapie zugelassen werden.

² Ery = Erythrozytenvolumen

³ für (Plasma-)Apherese-Spenden gilt: maximales Bruttoentnahmevervolumen (einschließlich Antikoagulans, ohne Untersuchungsproben):

bis zu einem KG von 60 kg 650 ml

bis zu einem KG von 80 kg 750 ml

bei einem KG von >80 kg 850 ml

⁴ Erythrozytenvolumen max. 500 ml.